Berggrunnskart

Bedrock map

BAMBLE – KRAGERØ

1:50.000

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE
· NGU ·

Vestfold og Telemark
FYLKESKOMMUNE

2020

Geologiske kart og data på internett: www.ngu.no

Topografisk grunnlag: Statens Kartverks N50 kartdata
Geodetisk grunnlag / kartprojeksjon: EUREF89 / UTM-sone 32
Digital kartproduksjon: Geomatikk, NGU
Plotteversjon: Mars 2020

INDUSTRIMINERALFOREKOMSTER (kun drift for kvarts)

ORE MINERAL OCCURRENCES (only in operation for quartz)

- Ap — Apatitt, *Apatite*
- Ba — Barytt, *Baryte*
- D — Dolomitt, *Dolomite*
- Fs — Feltspat (inkl. pegmatittisk feltspat), *Feldspar*
- C — Grafitt, *Graphite*
- Km — Kalkspatmarmor, *Calcite marble*
- Kv — Kvarts (inkl. pegmatittisk kvarts), *Quartz*
- Kv i brudd — Kvarts i brudd, omriss av bruddområde, *Quartz in quarry, outline of quarry*

MALMFOREKOMSTER (ingen i drift)

ORE OCCURRENCES (none in operation)

- Pb — Bly, *Lead*
- Au — Gull, *Gold*
- Fe — Jern, *Iron*
- Ti — Jern-titan, *Iron-titanium*
- Cu — Kobber, *Copper*
- Ni — Nikkel, *Nickel*
- Sulfider, *Sulphides*
- Ti — Titan, *Titanium*

BYGGERÅSTOFFOREKOMSTER

CONSTRUCTION MATERIAL OCCURRENCES

- Sk — Brudd for pukk, med omriss av bruddområde, i drift / nedlagt, (Gb= metagabbro, Pe= metagranitt/gneis, Gn= gneis, Gr= granitt)
  Quarry for aggregate, outline of quarry, in operation / abandoned, (Gb= metagabbro, Pe= metagranite/gneiss, Gn= gneiss, Gr= granite)
- Sk — Brudd for naturstein, i mylonittisk gneiss, omriss av bruddområde, murestein Lønne
  Quarry for dimensional stone, in mylonitic gneiss, outline of quarry, Lønne
- Gn — Brudd for naturstein, i mylonittisk gneiss, Kili gård ?
  Quarry for dimensional stone, in mylonitic gneiss, Kili gård

ALDERSBESTEMMELSER

AGE DETERMINATIONS

Prøvetakingssted for U/Pb radiometrisk alderbestemmelse
Sample location for U/Pb radiometric age determination

1. Biottitgranitt (Farsjø granitt): 1540 ± 30 Ma (zirkon; magmatisme); Slagstad et al., upublisert
   Biotite granite (Farsjø granite): 1540 ± 30 Ma (zircon; magmatism); Slagstad et al., unpublished
2. Biottitholdig granodioritt (Helle granitt): 1501 ± 11 Ma (zirkon; magmatisme); Slagstad et al., upublisert
   Biotite-bearing granodiorite (Helle granite): 1501 ± 11 Ma (zircon; magmatism); Slagstad et al., unpublished
3. Migmatittisk biottitgneiss: 1550 Ma (primær detritale zirkon populasjon), 1800-1700 Ma og arkaiske (sekundær zirkon populasjoner); Slagstad et al., upublisert
   Migmatitic biotite gneiss: 1550 Ma (main detrital zircon population), 1800-1700 Ma and Archaean (minor zircon populations); Slagstad et al., unpublished
4. Skapolittisert metagabbro: 1105 ± 9 Ma (zirkon; metamorfose); Slagstad et al., upublisert
   Scapolitised meta-gabbro: 1105 ± 9 Ma (zircon; metamorphism); Slagstad et al., unpublished
5. Skapolittisert metagabbro: 1111 ± 22 Ma (zirkon; metamorfose); Slagstad et al., upublisert
   Scapolitised meta-gabbro: 1111 ± 22 Ma (zircon; metamorphism); Slagstad et al., unpublished
6. Kvartsrik muskovitt-biottittgneis: 1600-1450 Ma (primær detritale zirkon populasjon), 1800-1700 Ma, 1950-1900 Ma (sekundære zirkon populasjoner); Slagstad et al., upublisert
   Quartz-rich muscovite-biotite gneiss: 1600-1450 Ma (main detrital zircon population), 1800-1700 Ma, 1950-1900 Ma (minor zircon populations); Slagstad et al., unpublished
7. Kvartsrik sillimanitt-biottittgneis: 1520-1450 Ma (primær detritale zirkon populasjon); Slagstad et al., upublisert
   Quartz-rich sillimanite-biotite gneiss: 1535-1450 Ma (main detrital zircon population); Slagstad et al., unpublished)
8. Biottitholdig granitt (Hærsfjell granitt): 1159 ± 14 Ma (zirkon; magmatisme); Slagstad et al., upublisert
   Biotite-bearing granite (Hærsfjell granite): 1159 ± 14 Ma (zircon; magmatism); Slagstad et al., unpublished
9. Biottitholdig granitt: 1500 ± 13 Ma (zirkon; magmatisme); Slagstad et al., upublisert
   Biotite-bearing granite: 1500 ± 13 Ma (zircon; magmatism); Slagstad et al., unpublished

   Finkorned migmatittisk granodiorittgneis: 1506 ± 18 Ma (zirkon; magmatisme), 2780 Ma (arvetre zirkon); Slagstad et al., upublisert
   Fine-grained migmatitic granitic gneiss: 1506 ± 18 Ma (zircon; magmatism), 2780 Ma (inheritance); Slagstad et al., unpublished
10. Pelitt: 1880-1560 Ma (detritale zirkon, jevn aldersfordeling); Slagstad et al., upublisert
    Pelite: 1880-1560 Ma (detrital zircon, even age distribution); Slagstad et al., unpublished
11. Migmatittisk granittisk gneis: 1503 ± 32 Ma (zirkon; magmatisme), 1143 ± 20 Ma (metamorfose); Slagstad et al., upublisert
    Migmatitic granitic gneiss: 1503 ± 32 Ma (zircon; magmatism), 1143 ± 20 Ma (metamorphism); Slagstad et al., unpublished
12. Porfyrittisk biottitholdig granitt (Farsjø granitt): 1502 ± 23 Ma (zirkon; magmatisme); Slagstad et al., upublisert
    Porphyritic biotite-bearing granite (Farsjø granite): 1502 ± 23 Ma (zircon; magmatism); Slagstad et al., unpublished
13. Biotitt-uralitt kvartsdioritt: 1562 ± 35 Ma (zirkon; magmatisme); Slagstad et al., upublisert
    Biotite-uralite quartz-diorite: 1562 ± 35 Ma (zircon; magmatism); Slagstad et al., unpublished
14. Ortopyroksen-granatførende kvartsdioritt: 1516 ± 25 Ma (zirkon; magmatisme); Slagstad et al., upublisert
    Orthopyroxene-garnet-bearing quartz-diorite: 1516 ± 25 Ma (zircon; magmatism); Slagstad et al., unpublished
15. Ortopyroksenholdig granittisk gneis/metavulkanitt: 1496 ± 21 Ma (zirkon; magmatisme); Slagstad et al., upublisert
    Orthopyroxene-bearing granitic gneiss/metavolcanite: 1496 ± 21 Ma (zircon; magmatism); Slagstad et al., unpublished
16. Rød porfyrittisk rapakivigranitt (Tråk granitt s.s.): 1148 ± 8 Ma (zirkon; magmatisme); Slagstad et al., upublisert
    Red porphyritic rapakivi granite (Tråk granite s.s.): 1148 ± 8 Ma (zircon; magmatism); Slagstad et al., unpublished
17. Foliert porfyrittisk hornblende-biotitt granitt: 1535 ± 39 Ma (zirkon; magmatisme); Slagstad et al., upublisert
    Foliated porphyritic hornblende-biotite granite: 1535 ± 39 Ma (zircon; magmatism); Slagstad et al., unpublished
18. Hornblende-biotitt tonalitt: 1581 ± 52 Ma (zirkon; magmatisme); Slagstad et al., upublisert
    Hornblende-biotite tonalite: 1581 ± 52 Ma (zircon; magmatism); Slagstad et al., unpublished
19. Biotitt- og gedrithholdig tonalitt: 1138 ± 14 Ma (zirkon; metamorfose); Slagstad et al., upublisert
    Biotite- and gedrite-bearing tonalite: 1138 ± 14 Ma (zircon; metamorphism); Slagstad et al., unpublished
20. Foliert hornblende-biotittholdig kvartsdioritt: 1538 ± 40 Ma (zirkon; magmatisme); Slagstad et al., upublisert
    Foliated hornblende-biotite-bearing quartz-diorite: 1538 ± 40 Ma (zircon; magmatism); Slagstad et al., unpublished
21. Hornblende-biotittholdig kvartsdioritt: 1531 ± 35 Ma (zirkon; magmatisme); Slagstad et al., upublisert
    Hornblende-biotite-bearing quartz-diorite: 1531 ± 35 Ma (zircon; magmatism); Slagstad et al., unpublished
22. Hornblende-biotittholdig kvartsdioritt: 1561 ± 39 Ma (zirkon; magmatisme); Slagstad et al., upublisert
    Hornblende-biotite-bearing quartz-diorite: 1561 ± 39 Ma (zircon; magmatism); Slagstad et al., unpublished
23. Biotittholdig granodioritt: 1564 ± 40 Ma (zirkon; magmatisme); Slagstad et al., upublisert
    Biotite-bearing granodiorite: 1564 ± 40 Ma (zircon; magmatism); Slagstad et al., unpublished
24. Sulfidholdig enderbittisk gneis: 1139 ± 11 Ma (zirkon; metamorfose); Engvik et al., 2016
    Sulphide-bearing enderbitic gneiss: 1139 ± 11 Ma (zircon; metamorphism); Engvik et al., 2016
25. Charnockittisk gneis: 1545 ± 7 Ma (zirkon; magmatisme); Engvik et al., 2016
    Charnockitic gneiss: 1545 ± 7 Ma (zircon; magmatism); Engvik et al., 2016
26. Granat-biottitgneis: 1542 ± 5 Ma (zirkon; magmatisme); Engvik et al., 2016
    Garnet-biotite gneiss: 1542 ± 5 Ma (zircon; magmatism); Engvik et al., 2016
27. Enderbittisk gneis (mafisk sill): 1149 ± 8 Ma (zirkon; magmatisme); Engvik et al., 2016
    Enderbitic gneiss (mafic sill): 1149 ± 8 Ma (zircon; magmatism); Engvik et al., 2016
28. Kvartsitt: 1950-1500 Ma (detritale zirkon), 1160 ± 3 Ma (metamorfose); Ahäll et al., 1998
    Quartzite: 1950-1500 Ma (detrital zircon), 1160 ± 3 Ma (metamorphism); Ahäll et al., 1998

   Albitisert metagabbro (Ringsje metagabbro): 1149 ± 7 Ma (zirkon; magmatisme); 1090 Ma (rutil ; metasomatose); Engvik et al., 2011
   Albitized metagabbro (Ringsje metagabbro): 1149 ± 7 Ma (zircon; magmatism); 1090 Ma (rutile ; metasomatism); Engvik et al., 2011
29. Rutilholdig albititt (Årevika albititt): 1101 ± 5 Ma (monazitt; metasomatose); Engvik et al., 2017
    Rutile-bearing albitite (Årevika albitite): 1101 ± 5 Ma (monazite; metasomatism); Engvik et al., 2017

   Klinopyroxenholdig albititt (Sjåen-Storkollen albititt): 1102 ± 2 Ma (titanitt; metasomatose); Engvik et al., 2017
    Clinopyroxene-bearing albitite (Sjåen-Storkollen albitite): 1102 ± 2 Ma (titanite; metasomatism); Engvik et al., 2017
30. Pegmatitt (Tangen pegmatitt): 1082,3 ± 4,5 Ma (columbitt; magmatisme); Müller et al., 2017
    Pegmatite (Tangen rare mineral pegmatite): 1082,3 ± 4,3 Ma (columbite; magmatism); Müller et al., 2017

Kartlagt av M. Marker (2003-08, 2011), T. Slagstad (2005-08), A. Solli (2002, 2007, 2010), og S. Gjelle (2002, 2004-06, 2008) T. Bjerkgård (2007-08).
Mapped by M. Marker (2003-08), T. Slagstad (2005-08), A. Solli (2002, 2007, 2010) and S. Gjelle (2002, 2004-06, 2008), T. Bjerkgård (2007-08).

Sammenstilt av M. Marker ved NGU. Sammenstillingen avsluttet 2018.
Compiled by M. Marker at NGU. Compilation finished 2018

Mikroskopi: ca. 520 bergartspraver (M. Marker)
Microscopy: c. 520 rock samples (M. Marker)

LØSMASSER FRA KVARTÆRTIDEN

DEPOSITS OF QUATERNARY AGE

1 — Tykk moreneavsetning (Ramorenen)
Thick moraine deposit (Ra Moraine)

BREKSJER OG GANGER AV ANTATT EDIACARA (580-540 MILLIONER ÅR)* ELLER PERMISK ALDER

BRECCIA AND DYKES OF EDIACARAN (580-540 MILLION YEARS) OR PERMIAN AGE*

2 — Ganger og lagganger; udifferensierte, i hovedsak mafiske bergarter
Dykes and sills; undifferentiated, mainly mafic rocks

Ganger; udifferensierte i hovedsak mafiske bergarter, punktobservasjoner
Dykes; undifferentiated, mainly mafic rocks, point observations

Vulkansk breksje; antatt av samme alder som Fensfeltet
Volcanic breccia; inferred coeval with the Fen complex

BAMBLE LITOTEKTONISKE ENHET

BAMBLE LITHOTECTONIC UNIT

Pegmatitter av antatt mesoproterozoisk alder

Pegmatites of inferred Mesoproterozoic age

3 — Pegmatitt
Pegmatite

Kragerø – Valle tektoniske enhet

Kragerø – Valle tectonic unit

Metasomatisk omdannede bergarter, antatt omdannelse av sten alder (1200-1000 millioner år)
Metasomatic altered rocks, inferred alteration of Stenian age (1200-1000 million years)

4 — Dolomitt; hydrotermal opprinnelse i metagabbro
Dolomite; hydrothermal origin in metagabbro

5 — Granitt; albittisert, rød; middelskornet, massiv
Granite; albitised, red, medium-grained, massive

6 — Albititt; metasomatisk omdannet gabbro (Na-metasomatose)
Albitite; metasomatic alteration of gabbro (Na-metasomatism)

7 — Gabbro; skapolitt-, og hornblendeførende, omdannet ved Na-metasomatose (Ødegårdritt)
Gabbro; scapolite-, and hornblende-bearing, altered by Na-metasomatism (Ødegårdite)

8 — Amfibolitt; albittisert, rødlig
Amphibolite; albitised, reddish

9 — Kvartsrik bergart; hematittførende, stedvis plagioklas- og ortoamfibolførende, øvrig mineralogi noe usikker, middels- til grovkornet
Quartz-rich rock; hematite-bearing, in places plagioclase- and orthoamphibole-bearing, further mineralogy uncertain, medium- to coarse-grained

10 — Antofyllitt-, kordieritt- og kvartsførende bergart; rik på malmmineraler, kvartsrik, grå, middelskornet, foliert
Anthophyllite-, cordierite-, quartz-bearing rock; rich in ore minerals, grey, medium-grained, foliated

11 — Biottitt-, kordieritt- og antofyllittisk bergart; kvarts og plagioklas-førende, middels- til grovkornet, varierende forhold mellom ulike mineraler, hovedsaklig langs kontakter av gabbrokropper
Biotite-, cordierite- and anthophyllitic rock; quartz- and plagioclase-bearing, medium- to coarse-grained, variable proportions between minerals, mainly along sheared margins of gabbro bodies

Antofyllittgneiss; stedvis med kordieritbergarter, mindre forekomster
Anthophyllite gneiss; in places containing cordierite rock, minor occurrences

12 — Skifer/Gneis; biottittisk, plagioklasførende med underordnet kvarts, stedvis med antofyllitt, aktinolitt, kordieritt eller granat, hovedsakelig langs kontakter av gabbrokropper
Schist/Gneiss; biotite-rich, plagioclase-bearing with subordinate quartz, in places with anthophyllite, actinolite, cordierite or garnet, mainly along sheared margins of gabbro bodies

Omdannede epikontinentale sedimenter av kalym alder (yngre enn 1500 millioner år)

Metamorphosed epicontinental sediments of Calymmian age (younger than 1500 million years)

13 — Gneis; migmatittisk, kvartsrik, sillimanitt-, muskovitt- og biottittførende, grå, fin- til middelskornet, stedvis med kordieritt, enkelte granater, stedvis med cm-store sillimanitt-kvartsnoduler
Gneiss; migmatitic, quartz-rich, sillimanite-, muscovite- and biotite-bearing, grey, fine- to medium-grained, in places containing cordierite, sporadic garnets, in places containing sillimanite-quartz nodules up to a few cm in size

14 — Gneiss; sillimanitt-, muskovitt- og biottittførende, kvartsrikt, rødlig, middelskornet, svakt foliert
Gneiss; sillimanite-, muscovite- and biotite-bearing, quartzitic, reddish, medium-grained, weakly foliated

15 — Gneis; kvarts- og plagioklasrik, sillimanitt-, muskovitt- og biottittkorittførende, lysegrå, middels- til grovkornet, moderat foliert
Gneiss; quartz- and plagioclase-rich, sillimanite-, muscovite- and biotite/cordierite-bearing, light grey, medium- to coarse-grained, moderately foliated

16 — Arkose; migmatittisk, kvarts- og feltspatrik, biottittførende, grå, finkornet
Arkose; migmatitic, quartzo-feldspathic, biotite-bearing, grey, fine-grained

17 — Gneis; granat- og biottittrik, stedvis med sillimanitt, grå, middelskornet, foliert
Gneiss; garnet- and biotite-rich, in places sillimanite-bearing, grey, medium-grained, foliated

18 — Marmor; uren, med lag av gneis, sedimentær opprinnelse
Marble; impure, interlayered with gneiss, sedimentary origin

19 — Konglomerat; matriksstøttet med boller hovedsaklig av kvarts, varierende grad av deformasjon
Conglomerate; matrix supported clasts of mainly quartz, variably deformed

20 — Kvartsitt; uren, med underordnet feltspat og glimmer, svakt grå, finkornet, lagdelt med sedimentære strukturer, stedvis med sillimanittnoduler, varierende grad av deformasjon
Quartzite; impure, with subordinate feldspar and mica, pale grey, fine-grained, layered with sedimentary structures, in places with sillimanite nodules, variably deformed

21 — Kvartsitt, uren med underordnet biottittkorit og mangan-oksydvitt, grovkornet, massiv, hydrotermalt rekrystallisert?
Quartzite; impure with minor biotite/chlorite and muscovite, coarse-grained, massive, hydrothermally recrystallised?

Omdannede bergarter av antatt vulkansk opprinnelse av kalym alder (ca. 1500 millioner år?)

Metamorphosed rocks of inferred volcanic origin of Calymmian age (c. 1500 million years?)

22 — Vulkansk breksje/agglomerat; felsiske fragmenter i finkornet dacittisk (kvarts+plagioklas) grunnmasse rik på biotitt, varierende grad av deformasjon
Volcanic breccia/agglomerate; felsic fragments in fine-grained dacitic (quartz+plagioclase) matrix rich in biotite, variably deformed

23 — Dacittisk gneis; biottittførende, lysegrå, finkornet, godt foliert, med tynne granittiske lag (migmatittisk?) og lag av amfibolitt
Dacitic gneiss; biotite-bearing, light grey, fine-grained, well foliated, with thin granitic layers (migmatitic?) and layers of amphibolite

24 — Gneis; kvarts-dioritisk til tonalitisk/dacitisk, biotitte-bearing, med amfibolittiske lag, stedvis granatførende, mørkegrå, finkornet, foliert
Gneiss; quartz-diorite to tonalitic/dacitic, biotite-bearing, with amphibolitic layers, in places garnet-bearing, dark grey, fine-grained, foliated

25 — Dacittisk gneis og amfibolitt; svart til mørkegrå, hornblendeførende, med underordnet clinopyroksen og titanitt, finkornet, svakt foliert; (suprakrustalt?)
Dacitic gneiss and amphibolites; black to dark grey, hornblende-bearing, with minor clinopyroxene and titanite, fine-grained, weakly foliated, (supracrustal?)

26 — Amfibolitt; dels biottitt- og granatførende, fin- til middelskornet, migmatittisk, foliert, stedvis diffust båndet (suprakrustalt)
Amphibolite, partly biotite- and garnet-bearing, fine- to medium-grained, migmatitic, foliated, in places diffusely banded (supracrustal)

Omdannede mafiske til ultramafiske dypbergarter av ektas alder (ca. 1300-1200 millioner år?)

Metamorphosed mafic plutonic rocks of Ectasian age (c.1300-1200 million years?)

27 — Hornblenditt; massiv, middels- til grovkornet (Levang)
Hornblendite; massive, medium- to coarse-grained (Levang)

28 — Hornblendit; delvis ortopyroksen-førende, stedvis granat-førende (kronitisk) (Ringsjåvassgabbro)
Hornblendite; partly orthopyroxene-bearing, in places garnet-bearing (coronitic) (Ringsjåvatnet gabbro)

29 — Peridotitt; kumulat i Bjordam gabbro
Peridotite, cumulate in Bjordam gabbro

30 — Gabbro; delvis foliert og omdannet til amfibolitt, stedvis granatførende
Gabbro; partly foliated and altered to amphibolite, in places garnet-bearing

31 — Gabbro og noritt; hovedsaklig massiv og lite omdannet
Gabbro and norite; mainly massive with limited alteration

Omdannede felsiske til intermediære dypbergarter av kalym alder (datert eller antatt ca. 1550-1500 millioner år)

Metamorphosed felsic to intermediate plutonic rocks of Calymmian age (dated or inferred c. 1550-1500 million years)

32 — Pegmatittisk granitt; lysegrå, grovkornet (2-3 cm), massiv
Pegmatitic granite; light grey, coarse-grained (2-3 cm), massive

33 — Granitt; hornblende- og klinopyroksenførende, lysegrå, middelskornet, massiv (sen granitt?)
Granite; hornblende- and clinopyroxene-bearing, light grey, medium-grained, massive

34 — Granitt; hornblende- og biottittførende, massiv, stedvis med granat
Granite; hornblende- and biotite-bearing, massive, in places garnet-bearing

35 — Granitt; hornblende- og biottittførende, rødgrå til rød, middelskornet (stedvis gryokornet), stedvis noe porfyrisk, massiv til moderat foliert, (Hellegrantitt)
Granite; hornblende- and biotite-bearing, reddish-grey to red, medium-grained (in places coarse-grained), in places slightly porphyritic, massive to moderately foliated (Helle granite)

36 — Granitt; hornblende- og biottittførende, porfyrisk, grå, middelskornet, foliert (Levanggranitten) (+Trollvannet i øst)
Granite; hornblende- and biotite-bearing, porphyritic, grey, medium-grained, foliated (Levang granite) (+Trollvannet to the east)

37 — Granittisk gneis; biottittførende, grå med rødlige granittiske årer, middelskornet, foliated
Granitic gneiss; biotite-bearing, grey with reddish granitic veins, medium-grained, foliated

38 — Granittisk gneis; migmatittisk, biottittførende, lysegrå med rødlige årer, finkornet, foliert
Granitic gneiss; migmatitic, biotite-bearing, light grey with reddish veins, fine-grained, foliated

39 — Granittisk gneis; migmatittisk, kvarts- og feltspatrik, biottittførende, lysegrå, fin- til middelskornet, foliert
Granitic gneiss; migmatitic, quartzo-feldspathic, biotite-bearing, light grey, fine- to medium-grained, foliated

40 — Granittisk gneis, god planfolasjon med tynne amfibolitt-lag, skjærsoltforvitret porfyrisk granitt?
Granitic gneiss; well defined planar foliation with scattered thin layers and fishes of amphibolite, sheared porphyritic granite?

41 — Tonalitt; biottittførende, middelskornet, foliert
Tonalite; biotite-bearing, medium-grained, foliated

42 — Trondhjemitt til granodioritt; biottittførende, lys rødgrå, middelskornet, svakt foliert
Trondhjemite to granodiorite; biotite-bearing, light reddish-grey, medium-grained, weakly foliated

43 — Kvartsdioritt til diorititt; biottitt- og gedrittførende, brungrå, middelskornet, stedvis med nekkromet gedritt (metasomatisk?), svakt foliert
Quartz-diorite to diorite; biotite- and gedrite-bearing, brownish-grey, medium-grained, in places with sheaf-like gedrite (metasomatic?), moderately foliated

44 — Kvartsdioritt; med biottit-hornblendestriper, grå, middelskornet, stedvis svakt foliert, med spredte tynne lag av amfibolitt (deformerte basiske ganger)
Quartz-diorite; with biotite-hornblende stripes, grey, medium-grained, in places weakly foliated, with scattered thin layers of amphibolite (deformed basic dykes)

45 — Kvartsdioritt/tonalitt gneis; migmatittisk, biottittførende, mørkegrå, fin- til middelskornet, godt foliert, med enkelte amfibolittlag
Quartz-diorite/tonalite gneiss; migmatitic, biotite-bearing, dark grey, fine- to medium-grained, well foliated, with a few amphibolite layers

46 — Kvartsdioritt gneis; migmatittisk, biottittførende, grå, finkornet
Quartz-diorite gneiss; migmatitic, biotite-bearing, grey, fine-grained

47 — Gneis; granatrik (25%), dioritt-, biotitt- og hornblendeførende, mørkegrå, middelskornet, alle granater med hvit halo
Gneiss, garnet-rich (25%); diorite, biotite- and hornblende-bearing, dark grey, medium-grained, all garnets with white halos

48 — Dioritt; med hornblende i striper, mørkegrå, middelskornet, foliert
Diorite, with stripes of hornblende, dark grey, medium-grained, foliated

Sannidal – Stokke skjærsone

Sannidal – Stokke shear zone

Metasomatisk omdannede bergarter av sten alder (1200-1000 millioner år)
Metasomatic altered rocks of Stenian age (1200-1000 million years)

49 — Amfibolitt-, plagioklas- og kvartsførende bergart; med lit biotitt og titanitt, lysegrå, planfoliert
Amphibolite-, plagioclase- and quartz-bearing rock; with minor biotite and titanite, light grey, planar foliation

50 — Amfibolitt; albittisert
Amfibolitt; albitisert

Omdannede dyphavssedimenter av kalym alder (yngre enn 1500 millioner år)

Metamorphosed deep-sea sediments of Calymmian age (younger than 1500 million years)

51 — Gneis (pelitt); sterkt migmatittisk, rik på rosa granat, sillimanitt- og biottitførende, stedvis med kordieritt og jernsulfid, med lag av amfibolitt, hovedsaklig med sterk planfolasjon
Gneiss (pelite); strongly migmatitic, rich in pink garnet, sillimanite- and biotite-bearing, in places with cordierite and iron sulphide, mainly strong planar foliation, with layers of amphibolite

52 — Kvartsitt; lysegrå, middels- til grovkornet, stedvis noe uren, lagdelt
Quartzite; light grey, medium- to coarse-grained, in places slightly impure, layered

Omdannede bergarter av antatt vulkansk opprinnelse av kalym alder (ca. 1500 millioner år?)

Metamorphosed rock of inferred volcanic origin of Calymmian age (c. 1500 million years?)

53 — Ryolitt; finkornet, biottittholdig
Rhyolite; fine-grained, biotite-bearing

54 — Amfibolitt; migmatittisk, fin- til middelskornet, foliert, stedvis diffust lagdelt og planfoliert, dels biotitt og granatførende (suprakrustalt)
Amphibolite; migmatitic, fine- to medium-grained, foliated, in places diffusely layered with planar foliation, partly biotite- and garnet-bearing (supracrustal)

Omdannede mafiske dypbergarter av ektas alder (ca. 1300-1200 millioner år?)

Metamorphosed mafic plutonic rocks of Ectasian age (c.1300-1200 million years?)

55 — Hornblenditt; ortopyroksenførende, middelskornet (stedvis noe grov), hercynitt-førende, massiv til foliert
Hornblendite; orthopyroxene-bearing, medium-grained (in places slightly coarse), hercynite-bearing, massive to foliated

56 — Gabbro; delvis foliert og omdannet til amfibolitt, stedvis med granat
Gabbro; partly foliated and altered to amphibolite, in places with garnet

57 — Gabbro og noritt; overveiende massiv og lite omdannet
Gabbro and norite, mainly massive with limited alteration

Omdannede felsiske til intermediære dypbergarter av kalym alder (datert eller antatt ca. 1500 millioner år)

Metamorphosed felsic to intermediate plutonic rocks of Calymmian age (dated or inferred c. 1500 million years)

58 — Granittisk gneis; migmatittisk, biottittførende, lysegrå, fin- til middelskornet, foliert
Granitic gneiss; migmatitic, biotite-bearing, light grey, fine- to medium-grained, foliated

59 — Granittisk gneis; migmatittisk, biottittførende, lagdelt, rødgrå, fin- til middelskornet, med lag av migmatittisk amfibolitt, planfoliert
Granitic gneiss; migmatitic, biotite-bearing, layered, reddish-grey, fine- to medium-grained, with layers of migmatitic amphibolite, planar foliation

60 — Granitt; hornblende- og biottittførende, rødgrå, middelskornet, moderat foliert
Granite; hornblende- and biotite-bearing, reddish-grey, medium-grained, moderately foliated

61 — Granitt til granodioritt; porfyrisk, hornblende- og biottittførende, rød, middelskornet, stedvis med litt granat, med enkelte amfibolittlag, massiv til foliert
Granite to granodiorite; hornblende- and biotite-bearing, porphyritic, red, medium-grained, in places with minor garnet, with a few amphibolite layers, massive to foliated

62 — Kvartsdioritt/tonalitt gneis; migmatittisk lagdelt, rødgrå hornblendeførende, migmatittisk, middelskornet, planfoliert
Quartz-diorite; migmatitic layered, biotite- and hornblende-bearing, dark grey, medium-grained, planar foliation

* samme alder som dannelsen av Fensfeltet
** same age as the formation of the Fen complex*

UTVALGT LITTERATUR

SELECTED REFERENCES

Engvik, A. K., Corfu, F., Solli, A., & Austrheim, H., 2017: Sequence and timing of mineral replacement reactions during albitisation in the high-grade Bamble lithotectonic domain, S-Norway: Precambrian Research, 291, 1-16.

Fjellanger, A. K., Mezger, K., Wortelkamp, S., Bast, R., Corfu, F., Kornelussen, A., Prien, P. M., Bingen, B., & Austrheim, H., 2011: Metasomatism of gabbro – mineral replacement and element mobilization during the Sveconorwegian metamorphic event: Journal of Metamorphic Geology, 29, 399-423.

Müller, A., Romer, R.L., & Pedersen, R.B., 2017: The Sveconorwegian Pegmatite Province – Thousands of pegmatites without parental granite: Canadian Mineralogist, 55, 283-315.

Nijland, T.G., Harlov, D.E. and Andersen, T., 2014: The Bamble Sector, South Norway: A review. Geoscience Frontiers 5, 635-658. See extensive references herein.

Slagstad, T., Marker, M. & Roberts, N. M. W.: unpublished U-Pb zircon geochronology using SIMS and LA-ICP-MS microanalytical methods.

Starmer, I.C., 1978, The major tectonics of the Bamble Series between Sandefjordfjord and Kristiansand (Aust-Agder and Telemark). Norges geol. Unders. 338, 37-58.

Starmer, I.C., 1976: The early major structure and petrology of rocks in the Bamble Series, Sandefjord-Sandnesfjord, Aust-Agder. Norge geol. Unders. 327, 77-97.

Morton, R.D., Bates, R. and O'Nions, R.K., 1970: Geological investigations in the Bamble Sector of the Fennoscandian Shield, South Norway. 1. The geology of eastern Bamble. Norges geol. Unders. Bulletin 263, 72 pp.

Engvik, A.K., Bingen, B. & Solli, A., 2016: Localized occurrence of granulite: P-T modelling, U-Pb geochronology and distribution of early-Sveconorwegian high-grade metamorphism in Bamble, South Norway. Lithos 240-243, 84-103.

Ahäll, K.I., Cornell, D.H. & Armstrong, R., 1998: Ion Probe zircon dating of sedimentary units across the Skagerak: new constraints for early Mesoproterozoic growth of the Baltic Shield. Precambrian Res. 87, 117-134.

Internettreferanse til NGUs malmdatabase

Farsjø – Skogen tektoniske enhet

Farsjø – Skogen tektonic unit

Omdannede felsiske dypbergarter av sten alder (ca. 1160 millioner år)

Metamorphosed felsic plutonic rocks of Stenian age (c. 1160 million years)

63 — Granitt; biottittførende, middels- til grovkornet, massiv (Harsfjellgranitten)
Granite; biotite-bearing, medium- to coarse-grained, massive (Harsfjell granite)

Omdannede dypvhavssedimenter av kalym alder (yngre enn 1500 millioner år)

Metamorphosed deep-sea sediments of Calymmian age (younger than 1500 million years)

64 — Gneis (pelitt); sterkt migmatittisk, rik på rosa granat, sillimanitt- og biottittførende, stedvis med kordieritt og jernsulfid, med lag av amfibolitt, hovedsaklig med sterk planfolasjon
Gneiss (pelite); strongly migmatitic, rich in pink garnet, sillimanite- and biotite-bearing, in places with cordierite and iron sulphide, mainly strong planar foliation, with layers of amphibolite

65 — Kvartsitt; lysegrå, middels- til grovkornet, stedvis noe uren, lagdelt
Quartzite; light grey, medium- to coarse-grained, in places slightly impure, layered

Omdannede bergarter av antatt vulkansk opprinnelse av kalym alder (ca. 1500 millioner år?)

Metamorphosed rock of inferred volcanic origin of Calymmian age (c. 1500 million years?)

66 — Granittryolitt; kvarts- og feltspatrik med litt biotitt, rødgrå til grå, finkornet, homogen, massiv til foliert, stedvis med lag av amfibolitt
Metagranite/rhyolite; quartz, and feldspathic with minor biotite, reddish-grey to grey, fine-grained, homogenous, massive to foliated, in places with layers of amphibolite

67 — Gneis; tonalittisk-, granodorittisk-, til granittisk (metadacitt/ryolitt?), biotittførende, grå, finkornet, stedvis med ortopyroksen, hornblende eller granat, sterk planstruktur med tynne amfibolittlag
Gneiss; tonalitic-, granodioritic-, to granitic (metadacite/ rhyolite?), biotite-bearing, grey, fine-grained, in places with orthopyroxene, hornblende or garnet, well-developed planar fabric with thin amphibolite layers

68 — Gneis; tonalittisk til kvartsdioritisk (metadacitt?), biottistripet, grå, med litt hornblende og granat, stedvis med ortopyroksen og klinopyroksen, med god planstruktur med tynne amfibolittlag
Gneiss; tonalitic- to quartz-dioritic (metadacite?), biotite-striped, grey, minor hornblende and garnet, in places with orthopyroxene and clinopyroxene, well-developed planar fabric with thin amphibolite layers

69 — Gneis; kvartsdioritisk/kvartsmonzonittisk, ortopyroksen-, klinopyroksen-, og hornblendeførende, mørkegrå, fin- til middelskornet, delvis migmatittisk, stedvis med noe granat eller biotitt, med spredte lag av pyribolitt
Gneiss; quartz-dioritic/quartz-monzonitic, orthopyroxene-, clinopyroxene-, and hornblende-bearing, dark grey, fine- to medium-grained, partly migmatitic, in places with minor garnet or biotite, with scattered layers of pyribolite

70 — Pyribolitt; ortopyroksen-, klinopyroksen-, og hornblendeførende, fin- til middelskornet, migmatittiske lag, stedvis med granat eller biotitt, hovedsaklig med god planfolasjon
Pyribolite; orthopyroxene-, clinopyroxene-, and hornblende-bearing, fine- to medium-grained, migmatitic layers, in places with garnet or biotite, mainly with good planar foliation

Omdannede mafiske dypbergarter av ektas alder (ca. 1300-1200 millioner år?)

Metamorphosed mafic plutonic rocks of Ectasian age (c.1300-1200 million years?)

71 — Hornblenditt; med litt ortopyroksen, klinopyroksen og plagioklas, middels- til grovkornet, massiv
Hornblendite; with minor orthopyroxene, clinopyroxene and plagioclase, medium- to coarse-grained, massive

72 — Gabbro og noritt; delvis foli