NGU
Norges geologiske undersøkelse
Geological Survey of Norway

NAMSOS

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

BERGGRUNNSGEOLOGISK KART M 1:250 000

BESKRIVELSE TIL KART OVER NORGE - 1:250 000 NAMSOS

Arne Solli, Tom Bugge og Terje Thorsnes

Kartleggingen på land har stort sett skjedd i forbindelse med NGUs Nord-Trøndelag program, et geologisk undersøkelsesprogram som har pågått i årene 1985 til 1996. Så godt som hele området er dekket av berggrunnskart i målestokk 1 : 50 000.

Kartleggingen av bergartene på sokkelen er basert på seismiske data samlet inn av Statens kartverk Sjøkartverket og K. Olsendirektoratet og oljeindustrien ellers, mens de kystnære områdene er kartlagt av NGU. Alderen på enhetene er delvis bestemt på grunnlag av IKUs grunne boringer og sjøbunnsprøver, og delvis ved jevnføring til andre områder.

GEOLOGISK OVERSIKT

Berggrunnen på landdelen av kartet er bygd opp av skyvedekker som ble skjøvet på plass under den kaledonske fjellkjedefoldningen som skjedde for ca. 500 mill. til 350 mill. år siden. De underste dekkene er skjøvet relativt kort, mens de øverste kan være hundrevis av kilometer fjernere. Den kaledonske fjellkjeden i Norge deles inn i 4 store dekke-enheter eller dekkesenter (allochthon på engelsk), som igjen deles inn i mindre dekke-enheter slik det er gjort på dette kartet. Den geologiske oppbygningen på kartbladet Namsos kan lettest forstås ved en tar på overskikkelsen.

Ytterdekket (se 75-74 på hovedkartet) og **nordøstre gneisområde og Formofossdekkekomplekset** (58-72) hører til *Uppe dekkesenter*. Disse består hovedsakelig av gneisbergarter og granitter som ble dannet i jordskorpa for lenge siden. Ytterdekket og Formofossdekkekomplekset er bare skjøvet over korte avstander.

Leksdalsdekket (56-57) hører til *Midtre dekkesenter*. Det består av ulike typer sandsteiner som i senprekambrisk tid ble avsatt på et gneisunderlag i vest, men som senere er blitt skjøvet til sin nåværende posisjon.

Trondheimsdekkekomplekset (22-36) og **Skjøtingsdekket** (37-55) tilhører *Øvre dekkesenter*. Skjøtingsdekket består av ulike typer skifre og amfibolitter. Alderen på disse er ikke kjent men ut fra det en vet ellers om tilsvarende dekke-enhet (*Seve*) i Sverige, er de trolig avsatt i tidlig til mellom kambrium og ordovicium. **Trondheimsdekkekomplekset** ligger over Skjøtingsdekket og består av sedimentære og vulkanske bergarter som er dannet i kambro-ordovicisk tid. Det er mindre områder enn det underliggende Skjøtingsdekket og tilhører *Kjelddekkene*.

Dypbergartene på Froan og helt nord på Vikna (18-21) er fra ordovicisk tid. Det er usikkert om disse tilhører *Øvre* eller *Øverste dekkesenter* som har stor utbredelse like nord for kartet.

Sedimentene fra jordens nytid og mellomtid (1-16) ute på sokkelen (og i Beitstadfjorden) er dannet etter at den kaledonske fjellkjedefoldningen var over. Sedimentene ble dannet ved at bergartene på land ble erodert ned og sand og grus ble transportert med elver ut i havet. Dette har tatt til en gradvis oppbygging av et sokkelområde som i dag har vanndyp på mindre enn 500 m. Fram til tertiærtiden ble disse bergartene avsatt i et grunt havområde mellom Norge og Grønland. For ca. 55 mill. år siden begynte Norge og Grønland å gli fra hverandre og Norskehavet som er mer enn 3000 m dypt utviklet seg. De eldste sedimentene på sokkelen er fra kritt- og jurasystemene (se tidstabellen) og dannet i havområdene like utenfor det bergarter fra trias som er de eldste. Som kartet viser, skyver bergartsformasjonene stort sett parallelt med kysten med de eldste bergartene nærmest land og de yngre er avsatt over disse lengst ute.

BESKRIVELSE AV BERGARTENE

OLDENDEKKET (73-74).

Disse bergartene opptrer helt i sørøst på kartet. De danner et tektonisk vindu som ligger under det overliggende Formofossdekkekomplekset utgjør det såkalte Tømmervatnvinduet. Den tektonostratigrafiske posisjonen tilsvarer Oldendekket som har sin egentlige utbredelse ca. 30 km mot nordøst. Disse bergartene har tilhørt det ternoskandiske grunnfjellsområdet som danner underlaget for dekkene på kartbladene i fjellkjeden i øst. Bergartene består av middelskornete **granittiske gneiser og migmatiter** (73). Det er vanskelig å skille disse fra bergartene fra hverandre i felt, og den granittiske gneisen kan være omdannet fra yngre granitter, som er en sur vulkansk bergart. Gneisen er gjennomsatt av **gabbro** (74). Bergartene er antatt å være fra mellomproterozoisk tid (se tidstabellen) og danner et 1600-1700 mill. år siden, men det er ikke gjort noen isotopaldersbestemmelse av dem.

NORDVESTRE GNEISOMRÅDE OG FORMOFOSSDEKKEKOMPLEKSET (58-72).

Dette er den enheten som har størst utbredelse innenfor kartet. I sør kan en tydelig se at den ligger tektonostratigrafisk over **Oldendekket**, og dertil har den blitt betegnet som **Formofossdekkekomplekset** her. I de vestre områdene opptrer den på en måte slik at den ofte er blitt betrakket som et grunnfjellsvindu, og her betegnes den for **nordvestre gneisområde.** Sammen med det nordøstsvenske gneisområdet danner disse områdene det som tidligere ble betegnet som Baltisk Berggrunnen i Vest-Norge. Forskjellige typer granittiske og granodiorittiske gneiser (59-63) som opprinnelig har vært dypbergarter er de vanligste bergartene. I nordøst finnes et større område med **øyegneis** (61), opprinnelig dannet fra en porfyrisk granitt. Dette henger sammen med den såkalte Geitfjellgranitten som opptrer like østenfor kartet. Denne er datert til 1828 ‘ 8 mill. år og er sammen med et tonalitt (datering 1 på kartet) de eldste kjente bergartene på kartet. **Migmatittgneis,** unndelt (66) er den største gruppen. I dette begrepet inngår et vidt spekter av bergarter, men grunnlaget er granodiorittiske gneiser er de vanligste. Om en ser på **Granittisk gneis** (59) er det en rød, lite migmatittisk gneis som opptrer i nordvestlig kelig i de østre delene av kartet. I Roan-området finnes **kvartsmonzonittiske gneiser** (64-65) mens det på Vikna opptrer en del marke **diorittiske** (67) og **amfibolittiske gneiser** (68).

Basiske bergarter utgjør en liten arealmessig del av de prekambriske bergartene. Små kropper av **gabbro** (70) opptrer over hele området. Disse er mange steder kjennetegnet ved en spesiell tekstur ved at granat vokser som en randsone rundt klinopyroksenkorn (koronateksturer). På Roanhalvøya opptrer flere typer bergarter som viser at disse bergartene er dannet på stort dyp. **Charnockitt** (60) som har granittisk sammensetning er en av disse. Den inneholder pyroksen og har spesielle mikroskopiske egenskaper. **Granulitt** (69) opptrer som smale striper med veksling mellom basiske bergarter og intermediære dypbergarter som er lagdelt i cm- til meters-skala. Foruten klinopyroksen, granat og kyanitt inneholder den også det sjeldne mineralet sapphirin. Overflatebergarter forekommer bare i begrenset omfang. **Ryodacitt** (71) er en sur vulkansk bergart som opptrer helt i sørøst-hjørnet av kartet. **Glimmerskifer** (72) opptrer i noen små områder, men blir alltid gjennomskåret av dypbergartene slik at denne bergarten trolig er den aller eldste på kartet. **Kvartsitt og kvartsskifer** (56) ser dermed ut å være avsatt sedimentært oppå gneisene og kan være av senproterozoisk alder.

LEKSDALSDEKKET (56-57)

Leksdalsdekkets bergarter ble avsatt i senproterozoikum og består av forskjellige typer sandsteiner. I **feltspatrik sandstein** (56) opptrer dalvasganger (for tynne til å merkes av på kartet) som er satt i forbindelse med havbunnspredning og dannelse av lapetushavet som tant sted tid før den kaledonske fjellkjeden ble dannet.

SKJØTNINGSDEKKET (37-55)

Denne enheten er nedfoldet i gneisene i lette nordøst-sørvestgående synformer som fører til at senpreget kartbilde. Helt i sørøst i Steinkjer-Snåsavassdraget ligger dekket i en synform under Trondheimsdekkekomplekset. Her er dekket delt inn i mindre enheter (*Hjelkbotngruppen*) nord og *Reinsvassgruppen* i sør). Tolig folnkommer disse enhetene også i andre deler av dekket. Det er på grunn av store likheter mellom disse at de er blitt betegnet som en og samme enhet. Dekket har fått formell inndeling utenfor dette området. En av de vanligste bergartene innenfor dekket er **amfibolitt** (48, 49) som mot øst går over til **grønnstein** (42) på grunn av lavere metamorfose. Enkelte steder i amfibolittene opptrer **marmor**, glimmerskifer og andre typer bergarter i så tynne soner at de ikke kan vises på kartet (50). **Felsitt** (41, 46) opptrer på to steder i lagrekka i tilknytning til *amfibolitt*ene og er trolig en sur vulkansk bergart. **Glimmerskifer** (51 og 44) er en annen viktig bergartstype. Den opptrer i to nivåer i lagrekka, i den øverste delen av *Hjelkbotn-gruppen* og helt nederst i *Reinsvassgruppen*. **Grafittførende skifer** (45) er en annen sikfer som er mindre utbredt. Enkelte har tolket disse glimmerskifrene til å være en del av *Guladekket*, en enhet som danner underste del av Trondheimsdekkekomplekset. Siden glimmerskifrene er så tett sammenfoldet med de andre bergartene i Skjøtingsdekket er den her lagt til dette dekket.

Flere steder forekommer **marmor** (47 og 53) av såpass hvit og ren kvalitet at den kan være egnet til industrielt bruk. I de nordlige områdene består dekket stort sett av **kalksilikatskifer og kalksilikatgneis** (52). Dekket har ser ut til å ha en lit annen sammensetning enn lengre sør selv om både **hornblendeglimmerskifer** (43) og **leirholdig skifer** (44) har ganske store likhetstrekk med kalksilikatbergartene. **Kvartsitt og kvartsskifer** (54) og **lys gneis** (55) er begge kvartsrike sedimenter som opptrer noen få steder innenfor dekket.

Dypbergarter forekommer bare i begrenset utstrekning og mest helt sør på kartet. En forgneiset **granitt** (38) har tidligere vært tolket som en del av det prekambriske grunnfjellsområdet, men er nå tolket til å være en del av dette dekket. **Gabbro** (40) forekommer bare i et lite område ved Selavatnet og innehalder en del ultramafiske linser. Fordi det ikke alltid er lke lett å definere hvor grensen mellom Skjøtingsdekket og Trondheimsdekkekomplekset går, er det mulig at alle disse dypbergartene hører til i det sistnevnte. **Metadiabas og trondhjemitt** (38) finnes bare i et lite område på Elvålandet.

TRONDHEIMSDEKKEKOMPLEKSET (22-36)

Bergartene i denne enheten ligger i en nordøst-sørvestgående synkline fra Steinkjer til Snåsavatnet. Stratigrafien er godt utredet i hele området. Underst ligger *Byhallformasjonen* som består av **grønnstein** (36). Denne enheten er ofte blitt tolket som en del av grunnfjellsområdet, men er nå tolket til å være en del av Trondheimsdekkekomplekset. Over Byhallformasjonen ligger Snåsavassgruppen som gjerne sammenholdes med *Lindre Hovingruppen* andre steder i dekket. Med sedimentær kontakt over Byhallformasjonen ligger et **konglomerat** (35) som er endrket fra grønnsteinen. Sure og basiske vulkanske bergarter opptrer to steder i lagrekka som **felsitt** (26, 31), **grønnstein** (27, 33), i **felsitt** (26) forekommer det flere mag netittlag som har dannet grunnlag for gruvevirksomhet i Malm siden århundreskifte. På begge sider av Snåsavatnet ligger en stor enhet av **metasandstein og kvartsskifer** (28). Den består av sandsteiner som er omdannet til metasandstein og kvartsskifer. **Fålsteinen** (30) består av grå, noen lynn some nordøst for Steinkjer. **Sandstein** (30, 34) opptrer på to steder i lagrekka og består stedvis mineralsider de mange konglomeratsoner. **Kalkfyllitt** (28) forekommer i et begrenset område ved sørenden av Snåsavatn Snåsavassgruppen blir overskåret av et lokalt skyvesplan av den overliggende og yngre enheten Beitstadgruppen (se profil B-B'). Beitstadgruppen sammenholdes gjerne med *Øvre Havningruppen* (-Ekkegruppen) etters i Trondheimsfeltet. Ved Follatoss ligger Beitstadgruppen med et konglomerat på en diskordans over Byhallformasjonen. Dette konglomeratet er dannet ved at en del av de prekambriske gneisene, men en alderdasdemmelse av den ikke sar for kartet har gitt 460 mill. år (upublisert). Bollene i dette **konglomeratet** (23) består av granodioritt, grønnstein og sure vulkanske bergarter av samme type som vertsbergartene for Foodatsmalmen. Ellers består Beitstadgruppen av **sandstein og sillstein** (22). **Dioritt og kvartsdioritt** (24) er datert til 440 mill. år (upublisert) og kan være yngre enn Beitstadgruppen.

OMDANNEDE DYPBERGARTER OG SEDIMENTER PÅ FROAN OG I VIKNA (18-21)

Disse bergartene opptrer på øyene i sørvest og på et lite område på Vikna helt i nord (de oppfører i et større område nord for kartet). Bergartene i begge disse områdene består av lite omdannede dypbergarter som **porfyrisk granitt** (18), og en enhet som varierer grados i sammensetning fra **dioritt til kvartsmonzonitt** (19) og en annen fra **kvartsdioritt til granodioritt** (20). Det finnes flere steder innslutninger av sedimenter av forskjellige typer i disse bergartene, men bare ett steed forekommer de i så store mengder at de er tatt med på kartet (**kalksilikatbergart,** 21).

BERGARTER FRA JORDENS NYTID TIL URTID (17)

Dette er fjellgrunnen utenfor kysten og i fjordene. Størstedelen av området består av de samme bergartene som på land, dvs. prekambriske gneiser og ordovicisk dypbergarter (Froan-området). En kan imidlertid ikke se bort fra at også andre bergarter finnes. I sørvest vet en at devonske bergarter opptrer bare ca. 5 km fra kyrkkanten, og det er ikke umiielig at disse bergartene strekker seg inn på kartet. Selv om store deler av området er sesmisk undersøkt kan en heller ikke se bort fra at det enrå kan finnes flere områder med sedimenter fra jordens middelalder.

BERGARTER FRA JORDENS MIDDELTID (9-16)

Bergartene fra tidligtrias (16) har fossiler som viser at de ble avsatt i et grunt hasområde. Senere i trias var det lange perioder med kontinentale forhold og avsetning av sand og leire på elvesletter og kystsletter som senere er omdannet til **sillstein og leirstein** (14,15). **Ærformasjonen** (13) fra tidligtura er det kull-lag som vitner om avsetning på elvesletter og i sumpområder med frodig plantevekst. I sen jura til tidlig kritt var det en periode med stor forkastningsvirksomhet som følge av havbunnsspredning i Nord-Atlanteren. Dette førte til at havbunnen sank inn, og de kystnære basengene med sedimenter fra tidlig- til mellomjura ble bevart (**sandstein og leirstein,** 12). I slutten av jura ble det avsatt leire med høyt organisk innhold (**Spekkhogstormasjonen,** 11). Denne finnes på Hestviksletten ar tilsvarende lag den vanligvis kildebergarten for olje, men innenfor kartblad Namsos har laget trolig ikke vært begravd dypt nok til at olje og gass er dannet.

BERGARTER FRA JORDENS NYTID (1-8)

Da Norskehavet åpnet seg i tidligtertiær tid ble det ledsaget av vulkansk aktivitet som gjenkjennes ved at det finnes lag av vulkansk aske sammen med lersteinen (**Tareformasjonen,** 7). De tertiære sedimentene (3-6) er avsatt som et resultat av erosjon av på land og de indre delene av kontinentalsokkelen. For ca. 2,5 mill. år siden startet den første store nedisingen i Norge, og over en tydelig erosjonsflate er det avsatt sand og leire av opptil 1500 m tykkelse (**Nausthformasjonen,** 2). Senere istider eroderte i disse og de eldre bergartene, og i dag ligger det et lag av **leire, sand, grus og morene** (1) over det meste av sokkelen (se profil A-A).

BERGARTENES OMDANNELSE (METAMORFOSE)

De prekambriske bergartene undergikk trolig en metamorfose (omdanning) i prekambrisk tid. Siden den kaledoniske metamorfosen har vært såpass sterk er det vanskelig å spore de eldre episodene. Det er i hvert tal vmelig å anta at en del av migmatittdannelsen i nordvestre gneisområde skjedde i prekambrisk tid.

Den kaledoniske metamorfosen varierer i de forskjellige dekke-enhetene og i de forskjellige områdene. I de øverste dekkene er bergartene omdannet under høyere temperaturer omdannet under høyere trykk- og temperaturforhold enn de østligste, de øverste dekke-enhetene mer omdannet enn de underste. Unntaket er Skjøtingsdekket som særlig i øst er mer omdannet en resten av dekkestabelen.

Store deler av det nordvestre gneisområdet bærer preg av å ha blitt omdannet under særlig høyt trykk. På Roan-halvøya viser mineralsammensetningen at bergartene har vært omdannet på ca. 50 km dyp ved ca. 870°C noe som tilsvarer granulittfacies metamorfose. Også andre steder viser koronateksturer i **gabbro** (70) at gneisene har blitt dannet på stort dyp. En Sm/Nd-datering (nr. 6 på kartet) viser at denne omdannlngen skjedde for ca. 430 mill. år siden. Etter høytrykksmetamorfosen har bergartene gjennomgått en forholdsvis rask hevning og har dermed gjennomgått tilbakevirkende metamorfose gjennom amfibolittfacies til grønnskiferfacies. Datering av de metamorfe mineralene tyder på at denne prosessen var over for ca. 400 mill. år siden.

Mye tyder på at Skjøtingsdekket har gjennomgått den samme omdannlngshistorien som de underliggende dekkene. Det er derfor mer sannsynlig at bergartene kjemlt og granat noe som viser at de i dag har bevart amfibolittfacies.

Trondheimsdekkekomplekset har ikke gjennomgått den samme høye metamorfosen som de underliggende gneisområdet og Skjøtingsdekket. Metamorfosen her er trolig ca. 10 mill. år yngre enn den som finnes i Roan-området. Samme sør ut til å være tilfellet med bergartene på Froan og i Vikna (18-21). Bergartene på sokkelen er umetamorfe, men har etter avsetningen gjennomgått en forsteiningsprosess (diagenese).

GEOLOGISK UTVIKLING

Det er antatt at de prekambriske bergartene har gjennomgått flere episoder med deformasjon i prekambrisk tid. Siden den kaledoniske deformasjonen har vært såpass sterk er det vanskelig å spore disse eldre episodene bortsett fra i enkelte lineær gneisene. Mot slutten av jordens urtid for ca. 7-800 millioner år siden, begynte det store kontinentet med gneiser å sprekke opp, og en fikk dannet et havområde, løpetusbavet, mellom den delen som ble det nordamerikanske kontinent (Laurentia) og det europeiske (Baltica). På havbunnen strømmet vulkanske bergarter opp og dannet ny havbunn. Denne prosessen med havbunnsspredning fortsatte å drive mot hverandre gjorde at den kaledonske fjellkjeden ble dannet, som et resultat av den etterfølgende "kollisjonen" mellom Laurentia og Baltica. Under denne prosessen ble de forskjellige dekke-enhetene som opprinnelig er dannet på forskjellige steder, transportert flere hundre kilometer fra nordvest og skjøvet oppå hverandre til en stabel med dekker. Både de prekambriske gneisene og de overliggende dekkebergartene ble deformert sammen i flere forskjellige faser. Samtidig med at dekkene ble skjøvet på plass ble bergartene omdannet til høyere grader. De mest intense omdannelsene på kartet (Roan) ble gneisel longst ned (ca. 50 km) og er derfor med omdannet, mens Trondheimsdekkekomplekset helt i særsl på kartet befant seg høyere oppe og er både lite omdannet og deformert. I en senere fase ble jordskorpen utsatt for strekning og bergartene på dypet beveget seg opp mot overflaten. Både fotdetyper og andre retningsindikatorer tyder på at de øverste dekkene i denne perioden beveget seg mot nordvest. En del av de mest framtredende strukturtrekk med nordøst-sørvestgående synklinaler og antiklinaler ble trolig dannet samtidig. Dateringer tyder på at dette skjedde i devonsk tid.

Fortsatte strekningsbevegelser utløste så skjærbevegelser som gav opphav til sedimentasjonsbasseng med retning nordøst-sørvest. *Hitra-Snåsalforkastningen* som strekker seg fra Hitra gjennom Skaudalen til Hjellebjørn og videre mot Snåsavatnet og Verrasforkastningen er de største av disse. Det har vært relativbevegelser på flere 10 km langs disse forkastningene. Det er trolig at det er disse som har dannet gelser i devon var vanstrekninga, mens den i mesozoikum var følgelinga. En kan se spor av det samme forkastningssystemet også i bergartene på sokkelen.

Det er også et svært markert sprekkesett med sprø deformasjon med retning nordvest-sørøst. Dette ser ut til å være en sen dannelse hvor det har vært liten bevegelse. Forkastningene på sokkelen er hovedsaklig dannet i perioden fra midten av jura til tidligkritt.

FOSSILER

Det enkelte sted fossiler er funnet på land innenfor kartet ligger nord for Snåsavatn. Fossilene ligger i **kalkstein** (29) tilhørende Trondheimsdekkekomplekset. Fossilene er av mange forskjellige typer: gastropoder, cephalopoder, brachiopoder og koraller, men de definerer ikke en eksakt alder. En mellomordovicisk alder er imidlertid sannsynlig. De fleste fossilene har armoksaks likevel. Det vil si at de ligger i rinnelig lite dannet på det nordamerikanske kontinentet (Laurentia). Under den kaledonske fjellkjedefoldningen er sammen med tilhørende bergarter skjøvet inn i dekkestabelen på vårt kontinent. I bergartene på sokkelen er fossiler vanlig.

ØKONOMISK GEOLOGI

Malm: En grove er for tiden i drift, men det er vedtatt at den skal legges ned sommeren 1997. Det er Nye Fosdalen Bergverk A/S i Malm. Gruven driver på jernmalm (magnetitt) som opptre sammen med svovelkis i en vulkansk bergart (**felsitt** 26) som også inneholder lag av grønnskifer og forskjellige sedimenter. Egnsmineralrådet er mektigheten på malmen, som er sagt å oppnre i linjaform, opptil 5-6 m. Langs samme bergartsenhet finnes en mengde skjerp av tilsvarende type. Ellers er det en rekke større og mindre skjerp på kartet. Ved Skrattåsen nord for Steinkjer er det skjerpet etter blyglans og sinkblende.

I Skjøtingsdekket finnes flere mindre skjerp av kobberkis, f. eks. Sørdeplassgruven i Malm. Ellers er det en rekke skjerp i Trondheimsdekkekomplekset. Disse er blitt og ellers er det mange mindre skjerp som bare fører svovelkis. I Nordvestre gneisområde er det skjerpet etter jern/titan (ilmenitt) på Gladsøya og på fellet Dågsma. Ellers opptrer kobberkis i en litt spesiell forekomst ved Høyrkves ved Namsos.

Industrimineraler: Det er flere brudd på kalkstein innenfor kartet. Bruddene forekommer både i Skjøtingsdekket og Trondheimsdekkekomplekset. I Snåsavassgruppen er det flere brudd på **kvartsskifer** (54) og **kvartsitt** (28). Kvartsskifrene er det et lite brudd ved Klinga sør for Namsos, men det er også funnet flere mulige områder for drift, f. eks. Hestvika, Deråsbrenna og Sela. Flere bergarter, særlig innenfor gneisene er vurdert brukt som **naturstein**, men det er også funnet flere mulige områder for drift, f. eks. Hestvika, Deråsbrenna og Sela. Flere bergarter, særlig innenfor gneisene er vurdert brukt som naturstein uten at dette foreløpig er blitt realisert. Det er også flere større og mindre pukkverk på kartet, de fleste innenfor

GEOLOGISKE TIDSENHETER

Geological time units



Etter Haq & van Eysinga, 1987. Plumb, Epstein & Terman, 1983. Sørensen, 1988 (kambrium) og Tucker & McKerrow, 1995 (perm)

HOVEDINNDELING AV BERGARTENE



Tegnforklaring

1. Sedimenter fra jordens nytid
2. Sedimenter fra jordens mellomtid
3. Uvartlagt hiatusm
4. Dypbergarter med usikker tektonisk posisjon
5. Trondheimsdekkekomplekset
6. Skjøtingsdekket
7. Leksdalsdekket
8. Nordvestre gneisområde og Formofossdekket
9. Oldendekket

Målestokk 1 : 250 000

0 5 10 15 20 25 km

Ekvidistanse 100 m

TEGNFORKLARING

BERGARTER FRA JORDENS NYTID (KENOZOIKUM)

NORDLANDSGRUPPEN

1. Leire, sand, grus og morenemateriale; kvartær (bare i snitteine)

NAUSTFORMASJONEN: serpilocen - kvartær

2. Sandsten og leirsten, glasialt påvirket

KAFFORMASJONEN: miocen

3. Leirsten, siltsten og sandsten med enkelte tynne kalksteinslag

HORDALANDSGRUPPEN

MOLOFORMASJONEN: tidligoligocen

4. Sandsten og siltsten

BRYGGEFORMASJONEN (øvre del): eocen - tidligoligocen?

5. Leirsten med lag av sandsten, siltsten og kalksten

BRYGGEFORMASJONEN (nedre del): eocen

6. Leirstein og siltstein med lag av sandsten og kalksten

ROGALANDSGRUPPEN

TARE FORMASJONEN: senpaleocen

7. Leirstein med lag av vulkanisk aske

SELANDE FORMASJONEN: paleocen

8. Leirstein med noe sandsten og kalksten.

BERGARTER FRA JORDENS MIDDELTID (MESOZOIKUM)

SHETLANDS- OG CROMER KNOLL-GRUPPEN; kritt

9. Leirstein, delvis karbonatførende, noe sandsten

VIKINGGRUPPEN

DRAUPNE FORMASJONEN: serpura - tidligkritt

10. Leirstein, rik på organisk materiale

MELKEFORMASJONEN: mellom- og serpura

11. Leirstein og siltstein

FANGSTGRUPPEN OG BÅTGRUPPEN (ØVRE DEL)

GARN, NOT-, ILE-, ROR- OG TILJEFORMASJONEN: og mellomjura

12. Sandstein og noe leirstein, med antatt kull-lag i Beitstadfjorden

BÅTGRUPPEN (UNDRE DEL)

ÆRFORMASJONEN: tidligjura

13. Sandstein med kull-lag (bare i snitteine)

SEDIMENTÆRE BERGARTER FRA TRIASTIDEN, UTEN FORMELL INNDELING

14. Leirstein og siltstein; sentrias
15. Leirstein og siltstein, mellom- og sentrias (bare i snitteine)
16. Leirstein, siltstein og sandstein; tidlig- og mellomtrias (bare i snitteine)

BERGARTER FRA JORDENS NYTID (KENOZOIKUM) TIL URTID (PREKAMBRIUM)

17. Uvartlagt havbunn. Overveiende prekambriske gneiser og paleozoiske dypbergarter

BERGARTER FRA JORDENS OLDTID (PALEOZOIKUM) OG URTID (PREKAMBRIUM)

OMDANNEDE DYPBERGARTER OG SEDIMENTÆRE BERGARTER PÅ FROAN OG I VIKNA, ANTATT ORDOVICISK ALDER. USIKKER TEKTONOSTRATIGRAFISK POSISJON

18. Granitt, porfyrisk til jevnkornet, lys rosa
19. Dioritt til kvartsmonzonitt, jevnkornet til porfyrisk, grå til rosa
20. Kvartsmonzonitt til granodioritt, mørk grå, foliert. Med ganger av rosa granitt
21. Kalksilikatbergart, grønnaktig, mørk grå til grønn

TRONDHEIMSDEKKEKOMPLEKSET. OMDANNEDE BERGARTER FRA ORDOVICISK TID. FRAMSKJØVET UNDER DEN KALEDONSKE FJELLKJEDEANNELSEN. (ØVRE DEKKESERIE)

BEITSTADGRUPPEN, OMDANNEDE SEDIMENTÆRE BERGARTER

22. Sandstein, noe omdannet og grå dukaske med enkelte lag av siltstein
23. Omdannet konglomerat med boller av ulike typer bergarter

OMDANNEDE DYPBERGARTER

24. Diorltt til kvartsdiorltt, hornblendeførende, middels- til grovkornet, mulgens yngre enn

25. Granodiorltt, gneisaktig, ikke migmattittisk

SNÅSAVASSGRUPPEN, OMDANNEDE SEDIMENTÆRE OG VULKANSKE BERGARTER

26. Felsitt, gråkrøa, hvit og lysegrønn. Inneholder lag av tuffitt og grønnskifer, og et meterhjkt

27. Grønnstein: med overgang til amfibolitt, stedvis finkornet med klastisk utseende. Inneholder lag av metasandstein

28. Kalkfyllitt, grå, med lag av sandstein

29. Omdannet kalkstein med overgang til kalkspatmarmor, blågrå til hvit. Delvis fossilførende

30. Sandstein

31. Omdannet sandstein med enkelte lag av konglomerat

32. Felsitt, hvit til lysegrå, med enkelte lag av konglomerat, agglomerat, og grønnstein

33. Omdannet kalkstein med overgang til kalkspatmarmor, blågrå til hvit

34. Grannsten og grønnskifer med enkelte lag av felsitt, fyllitt, kalkstein, o.l.

35. Konglomerat og sandig siltstein med endrket klast i lys grønnsand

36. Omdannet konglomerat, rikt på boller av ulike typer bergarter

BYHALLFORMASJONEN, OMDANNEDE VULKANSKE BERGARTER FRA TIDLIGORDOVICISK TID

37. Grønnstein til grønnskifer, stedvis grovkornet og feltspatrik

SKJØTNINGSDEKKET (TILSVARER SEVEDEKKET). OMDANNEDE BERGARTER FRA SENPROTEROZOISK TIL TIDLIGORDOVICISK TID, FRAMSKJØVET UNDER DEN KALEDONSKE FJELLKJEDEDANNELSEN. (ØVRE DEKKESERIE)

OMDANNEDE DYPBERGARTER

38. Granitt, forgneist, med sterk lineasjon
39. Metadiabas og trondhjemitt i veksling
40. Diorltt, stedvis forgneist
41. Metagabbro med enkelte linser av ultramafiske bergarter

HJELLEBOTN- OG REINSVASSGRUPPEN (ANTATT SENPROTEROZOISK ALDER). OMDANNEDE SEDIMENTÆRE OG VULKANSKE BERGARTER

42. Felsitt, hvit til lysegrønn, fin til grovkornet, stedvis massiv og/eller grafittførende
43. Grønnstein med overgang til amfibolitt, fin til grovkornet; stedvis med granat. Inneholder enkelte lag av felsitt
44. Hornblendeglimmerskifer og granatførende amfibolitt i veksling. Inneholder også band av sandig skifer, kalkglimmerskifer og marmor
45. Skifer, leirholdig til sandig, bålgrønn til grå, karbonatrik, til dels granatførende. Inneholder enkelte kalksilikatlag
46. Grafittskifer/felsitt med overgang til muskovitt-kvartsfyllitter. Inneholder enkelte lag av kalkstein, kvartsitt og kvartsittkonglomerat
47. Felsitt, hvit til lysegrønn, stedvis med granat eller hornblende og biotitt
48. Kalkspatmarmor, hvit, massiv eller i veksling med kalkglimmerskifer
49. Amfibolitt til grønnskifer, stedvis granatførende. Inneholder enkelte lag med felsitt, skifer og konglomerat

OMDANNEDE OVERFLATEBERGARTER UTEN FORMELL INNDELING, NEDSFOLDET I NORDVESTRE GNEISOMRÅDE

48. Amfibolitt, stedvis granatførende, antatt vulkansk opprinnelse, lokalt med små kropper av serpentinitt
49. Amfibolitt med enkelte tynne soner av glimmerskifer og kalkspatmarmor
50. Glimmerskifer, stedvis med granat, kyanitt og sillimanitt
52. Kalksilikatskifer og kalksilikatgneis, stedvis i veksling med glimmerskifer og kalkspatmarmor
53. Kalkspatmarmor, hvit, massiv eller i veksling med kalksilikatskifer
54. Kvartsitt og kvartsskifer
55. Lys gneis, båndet, fører amfibolitt, biotitt og epidot. Antatt sedimentær opprinnelse

LEKSDALSDEKKET (TILSVARER SÅRVDEKKET), OMDANNEDE SEDIMENTÆRE BERGARTER, ANTATT SENPROTEROZOISK ALDER. FRAMSKJØVET UNDER DEN KALEDONSKE FJELLKJEDEDANNELSEN.(MIDTRE DEKKESERIE)

56. Feldspatrik sandstein og arkose med diabasganger
57. Sandstein, finkornet og karbonatførende. Delvis siltstein

NORDVESTRE GNEISOMRÅDE, FORTSETTER MOT ØST OVER I FORMOFOSSDEKKEKOMPLEKSET. HOVEDSAKELIG GNEISER, MELLOMPROTEROZOISK ALDER, FRAMSKJØVET UNDER DEN KALEDONSKE FJELLKJEDEDANNELSEN. (UNDRE DEKKESERIE)

58. Kvartsitt og kvartsskifer, trolig med primær avsetningskontakt på gneisene
59. Granittisk gneis, rød, lite migmattittisk
60. Granittisk gneis, stedvis charnockittisk
61. Øyegneis, omdannet porfyrisk granitt
62. Granodiorittisk gneis, amfibolitførende, ikke migmattittisk
63. Granodiorittisk gneis, amfibolitførende, med talrike slirer av amfibolitt
64. Kvartsmonzonittisk gneis og augegneis
65. Monzodiorittisk til kvartsmonzonittisk gneis, grå
66. Migmattittgneis, ulmndelt, granittisk til granodiorittisk sammensetning
67. Diorittisk, tonalittisk og amfibolittisk gneis, stedvis med trondhjemittiske årer. Stedvis granatførende
68. Amfibolittisk gneis
69. Lagdelt komplekss; består av omdannede ibasiske dypbergarter med klinopyroksen, stedvis kyanitt og granat
70. Gabbro, delvis med koronateksturer
71. Ryodacitt, porfyrisk til finkornet (felsitt). Delvis sterkt forskifret
72. Glimmerskifer og lys gneiser av antatt suprakrustalt opprinnelse

NÆR STEDEGNE BERGARTER FRA MELLOMPROTEROZOISK TID (TILSVARER OLDENDEKKET)

73. Granittisk gneis, folert til massiv, middelskornet, og ryodacitt, fin- til middelskornet
74. Gabbro

GEOLOGISKE SYMBOLER

- Bergartsgrense, sikker/usikker
- Skyvefor kastning for Trondheimsdekkekomplekset
- Skyvefor kastning for Skjøtingsdekket (= Sævedekket)
- Skyvefor kastning for Leksdalsdekket (=Sårvdekket)
- Skyvefor kastning for Formofossdekkekomplekset
- Mindre skyvefor kastning
- Normalforkastning og markert sprekk. Rellatlv bevegelse angitt der dette er kjent. N=ned, H=opp
- Hovedfoldeaks med planets helning angitt (30° mot senast, loddrett = 100°
- Foldeaks med stupning angitt (90° mot nordøst, vannrett)
- Foldeaks med stupning angitt (90° mot nordvest, vannrett)
- Snittlinje
- Fossilfinnested
- Prøvepunkt for isotopaldersbestemmelse av bergart

GRUVE, ERTSFOREKOMSTER OG INDUSTRIMINERALER

- Sandstein, noe omdannet og dukaske med enkelte lag av siltstein
- Jern: magnetitt og svovelkis (gruve)
- Jern: magnetitt og svovelkis (skjerp)
- Jern/titan; ilmenitt
- Kobber; kobberkis
- Nikkel; pentlandilt og magnetkis
- Sink/bly; sinkblende og blyglans
- Jern og nikkel; svovelkis, magnetkis, o.l.
- Kalksteinsbrudd

Geologien på fastlandet er sammenstilt ved NGU av Arne Solli.
Geologien på kontinentalsokkelen er er sammenstilt ved IKU Petroleumsforskning av Tom Bugge. De kystnære deler av sokkelen og Beitstadfjorden er sammenstilt ved NGU av Reidun Bøe og Terje Thorsnes.
Sammenstillingen er datalert desember 1994.

Bidragsytere til kartet: Helene