

NGU-rapport nr. 86.103

Grusregisteret i  
Marnardal kommune  
Vest-Agder fylke



# Norges geologiske undersøkelse

Leiv Eirikssons vei 39, Postboks 3006, 7001 Trondheim - Tlf. (07) 92 16 11  
Oslokontor, Drammensveien 230, Oslo 2 - Tlf. (02) 50 25 00

Rapport nr. 86.103

ISSN 0800-3410

Apen/XXXXXX

Tittel:

## Grusregisteret i Marnardal kommune

Forfatter:

Knut Robertsen

Doktorgradsprosjekt

Fylkeskartkontoret i Vest-Agder  
NGU

Fylke:

Vest-Agder

Kommune:

Marnardal

Kartbladnavn (M. 1:250 000)

Mandal

Kartbladnavn og omravn (M. 1:50 000)

1411-1 Bjelland  
1411-2 Mandal

Forekomstens navn og koordinater:

Arealstall 49

Pris: 90,-

2

Feltarbeid utført:

1985

Rapportdato

desember 1986

Prinsipptekniskleder:

Knut Wolden

Gammendrag:

Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000.

Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller.

Det er registrert 11 forekomster; derav 9 sand- og grusforekomster, et massetak i morene og ett pukkverk drevet på en tunnelltipp. Det er registrert 5.5 mill. m<sup>3</sup> sand og grus, men store arealer er imidlertid båndlagt av dyrka mark og bebyggelse.

Fagrapport

Ressurskartlegging

Fagrapport

Ingeniørgeologi

Volum

Kvalitetsundersøkelse

Grusregister

## FORORD

Forberedelsene til etablering av Grusregisteret i Vest-Agder startet vinteren 1985 med gjennomgåelse av tilgjengelige opplysninger fra geologisk litteratur og flybildetolkning. Feltregistreringene ble utført feltsesongen 1985 og 1986. Senere er alle innsamlede data bearbeidet og lagt inn på EDB.

Flere personer fra NGU og fylkeskartkontoret har vært engasjert i dette arbeidet både under feltarbeidet og bearbeidingen av materialet.

Ivar J. Jansen fra fylkeskartkontoret i Aust-Agder har flybildetolket hele fylket. Ansvarlige for feltregistreringene har vært Knut R. Robertsen, Hans Jørund Hansen og Knut Wolden.

Laboratorieanalyser av prøvematerialet er utført av Anne Nordtømme, Johan Andersen og Asbjørn Bremseth. Klassifisering av bergarter og mineraler er utført av Knut R. Robertsen og Dag Ottesen. Janne Grete Wesche har overført data fra det manuelle registeret til EDB, digitalisert kartdata og vært ansvarlig for tekstbehandling av rapporten.

Undertegnede takker alle for vel utført arbeid.

Trondheim, 15. desember 1986



Peer-R. Neeb  
seksjonssjef



Knut Wolden  
prosjektleder

Knut Robertsen  
saksbehandler  
(sign.)

## FORORD

## INNHOLD

KONKLUSJON	6
BERGGRUNNEN	12
KVARTÆRGEOLOGIEN	14
JORDARTENES EGNETHET SOM BYGGERÅSTOFF	18
- breelvavsetninger	18
- elveavsetninger	18
- strandavsetninger	19
- morene	19
DANNELSE AV SAND OG GRUS	20
- korte trekk fra dannelseshistorien	20
SAND- OG GRUSKVALITETER	21
ULIKE AREALBRUKSINTERESSER	22
FORVALTNING AV SAND OG GRUS	24
GRUSREGISTERET	25
- Organisering	25
- Innhold i registeret	26
- Datainnsamlingen	27
- Databearbeidelse	31
BRUK AV GRUSREGISTERET	31
- Inngangsnøkler og presentasjon	31

MARNARDAL KOMMUNENE	34
- Konklusjon	35
- Antall og beliggenhet	35
- Volum og arealbruk	35
- Kvalitet og egnethet	36
- Videre undersøkelser	37
LITTERATUR	41

#### TEGNINGER

86.111-01 Vest-Agder fylke. Registrerte sand- og grusforekomster  
og lokalisering av pukkverk.

#### VEDLEGG

- 1.1 Forekomstskjema
- 1.2 Massetaksskjema
- 2.1 Tabell 1
- 2.2 Tabell 2.2
- 2.3 Tabell 5
- 2.4 Tabell 6
- 2.5 Tabell 7
- 3 Sand- og grusressurskart 1411-1 Bjelland

## KONKLUSJON

Etablering av Grusregisteret i Vest-Agder startet i 1985 etter avtale mellom Statens kartverk (Fylkeskartkontoret i Vest-Agder), Vest-Agder fylkeskommune, Miljøverndepartementet og NGU.

I løpet av 2 feltsesonger med totalt 85 feltdøgn er det registrert i alt 182 sand- og grusforekomster og 10 pukkverk i Vest-Agder. Av disse er 121 forekomster volumberegnet og gir samlet en reserve på 88 mill.  $m^3$  sand og grus. Dette tilsier at Vest-Agder har lite sand og grus i forhold til andre fylker hvor Grusregisteret er etablert. Til sammenligning har Buskerud 1.2 milliard, Oppland 980 mill., Telemark 698 mill., Møre og Romsdal 507 mill., Sogn og Fjordane 370 mill., Aust-Agder 217 mill. mens Vestfold kun har 41 mill.  $m^3$  sand og grus. Volum pr.  $km^2$  og innbygger i de samme fylkene er vist i fig. 1.




Fig.1

Forekomstene er ujevnt fordelt og brukbarheten til teknisk formål varierer en del innen fylket.

De største konsentrasjonene av sand og grus ligger sør for Raet i dalførerne langs Otra, Manndalselva, Audna, Lyngdalselva, Kvina og Sira, og der dalene munner ut i store sjøer som i Sirdal og Åseral, tegning 86.111-01.

Volummessig må kommunene Flekkefjord, Lyngdal og Vennesla betraktes som overskuddskommuner. Åseral, Hægebostad, Kvinesdal, Marnardal, Audnedal, Lindesnes og Sirdal har tilstrekkelig tilgang på sand og grus for å dekke det lokale behov. I Søgne kommune er det ubetydelige mengder sand og grus. De øvrige kommunene har noe, men må likevel betraktes som underskuddskommuner, fig. 2, 3 og vedlegg 2.1. I heiområdene i de indre kommunene Kvinesdal, Sirdal, Åseral og Hægebostad er det en god del rygger (eskere) med sand og grus. Disse ligger ofte langt fra vei og er ikke befart, men registrert fra flybilder og tegnet inn på sand- og grusressurskartene.

## SAND- OG GRUSRESERVER I KOMMUNENE

MED ANDEL BEBYGDE VOLUM





Fig. 2

# VEST-AGDER FYLKE

SAND- OG GRUSRESSURSER 1986



De mange steintippene etter kraftverksutbyggingen rundt om i fylket kan være et godt tilskudd, da det i alle kommunene er underskudd av grovt materiale.

Det er registrert 10 pukkverk i fylket hvorav 7 er i drift. Av disse ligger 4 i Kristiansandsområdet. I områder med underskudd på naturgrus er pukk et naturlig erstatningsmateriale. Lokalisering nær forbrukssentra gir konkurransedyktige priser i forhold til import av naturgrus. Tilsvarende gjelder når naturgrusen ikke tilfredsstiller kvalitetskravene til generelle eller spesielle byggtekniske forhold.

Av det totale volum består over 70 % av sand, fig. 4. I tillegg til generelt underskudd på grove masser er grusmaterialet svakt og knuses lett ned selv ved moderate slagbelastninger. Dette gjør det vanskelig å skaffe god grus til vegformål i fylket, fig. 5. Som en konsekvens av dette importeres årlig store mengder pukk fra Rekefjord for bruk til vegformål.

## VOLUM FORDELT PÅ AREALBRUK OG KORNSTØRRELSE




Fig. 4

De fleste kommunene er selvforsynt med sand til betong- og støpearbeider med vanlige krav til styrke. I mange forekomster eller deler av disse, er sanden ofte ensgradert og finkornig. Innholdet av mineraler som kan svekke betongens trykkfastheter varierer også. Det er derfor viktig at man ved lokalisering av uttaksområder tar hensyn til disse forhold.

Det må understrekkes at den vurdering av kvalitet som er gjort i Grusregisteret, refererer seg til materialet i naturlig tilstand. Ved foredling og bruk av tilsettingstoffer kan en dårlig naturlig kvalitet forbedres. For å få en nøyaktig oversikt over kvalitet og volum for ulike tekniske formål er det nødvendig med mer detaljerte undersøkelser.

Det er også viktig å være klar over at den anvendelige delen av de beregnede volum ofte kan være betydelig mindre enn totalvolumet som er oppgitt. Foruten de kvalitetsmessige kriterier, kan også arealbruken legge begrensninger på det uttagbare volum. Fig. 4 viser at ca. 20 mill. m<sup>3</sup> av det totale volum er båndlagt av bebyggelse og kommunikasjonsarealer. Av de øvrige volum ligger ca. 40 mill. m<sup>3</sup> under dyrka mark, vel 20 mill. m<sup>3</sup> er bevokst med skog og 4 mill. m<sup>3</sup> ligger i eksisterende massetak.

Etter hvert som forekomstene blir grundigere undersøkt og driftsforholdene i massetakene forandrer seg er det viktig at Grusregisteret oppdateres.

For å få en fullstendig oversikt over ressurssituasjonen for sand og grus i fylket, er det nødvendig å lage et ressursregnskap. Da vil man få en oversikt over uttaksmengder, transportveger, bruksområder og forbrukere. Overskudds- og knapphetsområder vil kunne kartlegges, og dermed hvor presset på ressursene er størst. Man får et grunnlag for å utarbeide uttaksplaner og vurdere forsyningssområder for å dekke framtidige behov for sand og grus, eventuelt hvor det er behov for knust fjell for produksjon av pukk.

# VEST-AGDER FYLKE

Mekaniske styrkeegenskaper vurdert etter bergarts-tellinger i fraksjon 8-16 mm

## TEGNFORKLARING




Fig. 5

BERGGRUNNEN  
av P. Padget

Berggrunnen i Vest-Agder er sammenstilt på kartbladene Mandal og Sauda i NGUs kartserie i målestokk 1:250 000, samt på berggrunnskart over Norge i målestokk 1:1 mill.

Berggrunnen består hovedsakelig av Agderkompleksets bergarter som er et gneis-migmatittkompleks av prekambrisisk eller Proterozoisk alder. De eldste bergartene som er dannet under den svekokarelske fjellkjededannelsen for omtrent 2 milliarder år siden, består av migmatittiske båndgneiser, granittiske gneiser og øyegneiser, samt mindre mengder andre bergarter.

Bergartenes nåværende krystalline karakter skyldes langvarig oppvarming og omfattende omkrystallisering (metamorfose) i et dypere snitt av jordskorpen. Oppsprekking og folding forekom under flere faser av fjellkjededannelsen.

Etter at disse prosesser begynte å avta for 1000 millioner år siden trengte store magmamasser opp fra dypet og dannet Egersundkomplekset. Den østlige delen av komplekset finnes i den sydvestlige delen av Vest-Agder i Flekkefjord-Lyngdalområdet, hvor det er representert ved anortositt, pyroksen-kvartsmonzonitt og charnockitt. Andre dypbergarter finnes øst og nord for Farsund, bl.a. hornblende- og biotittførende granitter. Disse er sannsynligvis noe yngre men fortsatt av Proterozoisk alder.


Intrusjon av disse dypbergartene førte til en temperaturøkning i de eksisterende gneiser med omkrystallisering og ny mineraldannelse som resultat.

Intrusjons- og metamorfoseprosessen anses som ferdig for ca. 900 millioner år siden, og jordskorpen i denne del av Vest-Agder stabilisert.

Langs kysten fra Mandal til Kristiansand finnes enkelte små doleritt-(diabas) eller lamprofyrganger av permisk alder, fig. 6.

# BERGGRUNNEN I VEST-AGDER FYLKE

Forenklet etter berggrunnskart over Norge, M 1:1 mill. NGU 1984



## KVARTÆRGEOLOGIEN

Løsmassene i Norge er for det meste dannet i sluttfasen av siste istid og under isavsmeltingen for ca. 10 000 år siden.

Karakteristisk for fylket er en mangel på løsmasser. De løsmassene som finnes er koncentrert til dalgangene. Mellom dalene er løsmassedekket meget sparsomt. Raet, en endemorene dannet for ca. 10 000 år siden, inntar en meget sentral plass i fylkets kvartærgеologi. Denne markerte moreneryggen styrer løsmassefordelingen i dalbunnen.

Raet kommer inn i Vest-Agder ved Verås i Vennesla og fortsetter nesten som en sammenhengende rygg til sørrenden av Sirdalsvatn. Den danner opptil 25 m høye rygger, og flere steder framtrer disse som frittliggende høydepunkter, f.eks. Loland i Vennesla. Noen steder danner Raet parallelle rygger eller et morenebelte. Blokkinnholdet i Raet er de fleste steder meget stort.

Før Raet ble dannet var Listatrinnet og Spangereidtrinnet avsatt. Dette er også morenerygger, men av mindre størrelse og utstrekning. Hele Listatrinnet og deler av Spangereidtrinnet er vasket av havet, og noen steder er det dannet strandvoller, f.eks. ved Tjøm, Underø og Spangereid, foruten på Lista.

Avsetningene i hoveddalene er dominert av breelvavsetninger nær Raet og elveavsetningene ytterst mot kysten. Nær Raet dekker sanduravsetninger hele dalbunnen. Dalbunnen ved Korsmo er et godt eksempel på en sandur. Materialet er grovt med mye stein og grus. Etter få kilometer avtar kornstørrelsen markert, og sandurflata er nederodert og danner terrasser i dalsidene. Elveslettene dominerer da dalbunnen. Ytterst i dalene består terrassene av finsand og silt. Disse er avsatt i havet for 5 000-10 000 år siden. Havet stod da høyere enn i dag. Den marine grense (MG) angir dette nivå. Den er i Kristiansand ca. 28 m o.h. for å synke vestover til 7-8 m o.h. på Lista.

Nord for Raet er dalenes basseng- og trauførmer fylt opp av relativt tynne breelv- og elveavsetninger med liten dybde til grunnvannsspeilet. I Sirdal er det imidlertid utviklet større og mektigere avsetninger.

Noen mindre sidedaler har en drenering mot nord. Selv om dette er over relativt korte avstander, er disse dalene fylt opp med til dels store


mengder finsand og silt. Ved Hægeland i Vennesla er det isen i nord som har dannet en bresjø som dette materialet er avsatt i. Ved Øverbø i Vennesla og Lavstøl vest for Kvinlog har Raet stått for denne oppdemningen.

I de fleste dalene som har en retning øst-vest, er det lagt opp morene i den sørlige dalside, altså på tvers av den retning innlandsisen beveget seg. Dette er kalt støtsidemorene og er vanlig i de fleste øst-vestgående daler. Det er også en tendens til morene på lesidene. Materialet er her mindre og ligger helt nede ved fjellfoten, mens det på støtsida går et stykke opp i dalsida. Blokkinnholdet er stort.


Lista innehar en spesiell stilling i Vest-Agders kvartærgeologi. Mange formtyper og jordarter er her representert. Den kvartære utviklingshistorie er enda ikke fullt ut forstått. Stedet er derfor et viktig forskningsområde. Sammen med Jæren var Lista det første kystområdet som smeltet fram fra innlandsisen for ca. 13 500 år siden. Lista er også det største sammenhengende området med løsmasser i Vest-Agder.

Dagens prosesser i de kvartære avsetninger består av erosjon i de elvenære avsetninger, transport av dette materialet i elvene og avsetning ytterst i elvemunningene. Slike deltaavsetninger i dagens havnivå sees tydelig ved Manndalselvas utløp i Mandal, Audna ved Snig og Lyngdalselva i Lyngdalsfjorden. Dette kan være mulig framtidige sandkilder. Der løsmassene ligger eksponert for havet, vil bølger og vindens aktivitet være med å forme landskapet. Lista er et godt eksempel på dette.

Fig. 7 SANDUR. SITUASJONEN ER KARAKTERISTISK FOR DANNELSEN AV MANGE SAND- OG GRUSFOREKOMSTER I VEST-ÅGDER




- A. Breeelver sprer seg ut over dalbunnen foran isfronten. Disse fører med seg løsmasser og bygger opp en sandur.



- B. Isen har trukket seg tilbake og raet demmer opp en innsjø. Elven har skåret seg ned i avsetningen, og lenger nedover i dalen er det dannet elvesletter.

Karakteristisk er tilnærmet horizontal lagdeling med grovt materiale som stein og blokk nærmest Raet, mens kornstørrelsen avtar gradvis utover i dalen.

Fig. 8: DANNELSE AV ESKER




A

B

- A: Sand og grus blir avsatt av en breelv i sprekker eller tuneller i en stagnerende isbre.
- B: Isen er smeltet bort og sand og grus ligger igjen som rygger og hauger i terrenget.

NOEN TYPISKE KORNFORDELINGSKURVER



① MÖRENEMATERIALE    ② ELVEMATERIALE    ③ BREEELVMATERIALE

Fig. 9: NOEN TYPISKE KORNFORDELINGSKURVER.

## JORDARTENES EGNETHET SOM BYGGERÅSTOFF

### Breelvavsetninger

Breelvavsetninger er de viktigste sand- og grusressursene i området. De er ofte bygget opp i mektige lag med sand og grus. Større deltaavsetninger har horisontale topplag av grus og stein. Grunnvannsnivået er oftest lavt, og massene er rene og vanligvis fri for skadelig innhold f.eks. av korrosive stoffer eller humus.

Særlig er forekomster knyttet til Raet og avsetninger fra brattere siderdaler attraktive fordi disse ofte har god tilgang på grovere materiale av grus og stein, noe som er nødvendig f.eks. til veg- og betongformål. I særlig grad krever vegbygging bruk av de grovere kornfraksjoner. Nedover i forekomstene kan imidlertid innholdet av mellom- og finsand, til dels også silt være betydelig.

### Elveavsetninger

Store arealer i dalførene har elveavsetninger. I daler med slak lengdeprofil (hoveddalførene) består disse oftest av sand. For en stor del vil dette være godt sortert (ensgradert) sand, ofte i størrelsen fin- og mellomsand. Dels også med siltinnhold. Forekomster som er dominert av finsand (middelkornstørrelse  $< 0.2 \text{ mm}$ ) faller utenfor klassifikasjonen som sand-/grusressurs.

Elveavsetninger har vanligvis også lavere mektighet ned til finsedimenter eller grunnvannsnivået enn breelvavsetningene. De vil også ofte være betydelige "forurensset" av organisk materiale (humus) eller jernutfelling.

### Strandavsetninger

Strandavsetninger består vanligvis av sand, men lokalt også grovere materiale, slik som i de mange strandvollene på Lista og ved Spangereid. Generelt opptrer strandavsetningene som relativt tynne lag med få meters mektighet over havavsetninger eller morene. Slik avsetningstypen opptrer i Vest-Agder vil de være uegnet til større masseuttak.

Strandavsetningene er ofte ensgradert og kan ha en del utfelling av jern/humus.

### Morene

Morenemateriale består av alle kornstørrelser fra blokk til leir og blir vanligvis ikke regnet som sand- og grusressurs. Sporadisk brukes imidlertid en del morenemateriale, f.eks. til bygging av skogsbilveier. Grusrik morene kan også være egnet til andre byggetekniske formål etter bearbeiding/foredling, evt. også blandet med annet materiale.

(NB! Det som folk flest karakteriserer som morene, f.eks. massene i et grustak, er etter de definisjoner som her blir brukt, breelvavsetninger).

## DANNELSE AV SAND OG GRUS

Sand- og grusressurser er løsmasser som fra naturens side er sortert og anriket i sand- og grusfraksjonen (sand: 0.063 - 2 mm, grus: 2 - 64 mm). De viktigste sand- og grusressursene i fylket er dannet som breelvavsetninger (glasifluviale avsetninger) under isavsmeltingen. Viktige naturgitte forhold som har bestemt forekomstenes beliggenhet, volum og kvalitet har vært:

### - Isfrontens beliggenhet

Isfronten hadde et markert opphold i tilbaketrekningen for ca. 10 000 år siden. Da ble den store endemorena Raet dannet. Materialet ble også spilt ut i dalene sør for Raet og fylte hele dalbunnen. Dette er de såkalte sanduravsetningene som er de viktigste gruskildene i fylket, fig. 7. De to andre endemorenene Listatrinnet og Spangereidtrinnet, har ikke dannet tilsvarende store grusforekomster.

### - Havets og sjøens nivå

Noen av de større sand- og grusforekomstene i de østlige deler av fylket ligger i nivå med havets største utbredelse, den marine grense (MG). I dette nivået ble materialet avsatt som et delta under vann. Da landet hevet seg etter istida ble disse forekomstene tørrlagt. Tilsvarende forhold gjelder ved avsetning i innsjøer. Slike eksempler finnes i Sirdal og Åseral.

### - Agnordaler

Dette er daler som har en drenering mot N, NV eller NØ. Det vanlige i Vest-Agder er mot S. Da innlandsisen smeltet tilbake mot N dannet det seg sjøer i disse dalene støttet opp av isen. I disse sjøene ble det avsatt materiale, mest sand. Flere av de kartlagte sandforekomstene i registeret er dannet på denne måten.

I alle disse typer avsetninger har ofte elvene under den senere landheving skåret seg ned og avsatt materialet lenger ut langs vassdragene, som elveavsetninger. Langs vassdragene sees ofte ulike terrassenivåer og erosjonskanter som forteller om disse prosessene. De øverste terrassene representerer da gjerne breelvavsetningene.

Breelvmateriale ble også enkelte steder avsatt i smeltevannstuneller under isen. Når isen senere smeltet lå det tilbake rygger og hauger av grus og sand (eskere), opptil 15-20 m høye over terrenget omkring. Se fig. 8.

## SAND- OG GRUSKVALITETER

Sand er pr. definisjon materiale mellom 0.063-2.0 mm. For byggetekniske formål er den fineste aksepterte kornstørrelsen 0.2. Avsetninger med finere middelskornstørrelse enn dette har i dag liten praktisk interesse annet enn til fyllmasse. Disse er derfor i den grad det har vært mulig, ikke tatt med i registeret.

I denne rapporten er alle kvalitetsbetrakninger vurdert på grunnlag av visuelle metoder ut fra krav til vei- og betongformål.

I mange av forekomstene er sand den dominerende kornstørrelse. Ofte finnes grus bare i topplaget og med begrensede mektigheter. Dette begrenser også anvendbarheten av forekomstene til veiformål, hvor det er ønskelig med grov grus og stein som kan knuses ned til ønskede kornstørrelser. Knuste masser gir bedre stabilitet i bærelag og forsterkningslag enn naturgrus, og blir derfor foretrukket selv om rundet naturgrus ofte er noe sterkere.

Hovedkriteriene er kornstørrelse, styrken på grusmaterialet mot slag og abrasjon, samt innholdet av glimmer og andre uheldige stoffer i sanden. Utgangspunktet for vurderingen er dessuten dagens teknologi og økonomiske situasjon.

Berggrunnen i Vest-Agder består hovedsakelig av gneis i ulike varianter, og en del granitt, fig. 6. Ofte gir disse bergartene grusmateriale av tilfredsstillende kvalitet til de fleste veiformål (høy ripemotstand og god motstandsdyktighet mot nedknusing).

I Vest-Agder viser undersøkelser at naturlig sortert grus har høy ripemotstand, men mindre god mekanisk styrke som gjør at den lett lar seg knuse ned selv ved moderate påkjjenninger. En har derfor problemer med å bruke grus fra de fleste forekomstene i fylket som tilslag til faste veidekkere (asfalt). Til forsterkningslag i veier med moderat trafikkbelastning kan massene derimot benyttes.

For betongformål er flere forhold av betydning, men spesielt kornstørrelse og mineralinnhold bør bemerkes. For å få en tett betong er det viktig at sanden har en jevn fordeling av alle kornstørrelser slik at det ikke oppstår luftpurer og dermed svekkelse av betongkvaliteten. Mange av forekomstene har overskudd av sand, og ofte er denne ensgradert med en steil siktekurve. Denne er derfor først etter bearbeiding gjennom siktning,

blanding med andre masser osv. egnet til betongformål med høye kvalitetskrav.

Innholdet av glimmer og skiferkorn i sanden har betydning for betongens vannbehov. Høyt innhold av slike mineraler øker betongens vannbehov og dermed øker også cementbehovet dersom bearbeidbarheten og styrken av betongen skal ivaretas. De forekomstene i fylket som er undersøkt med henblikk på dette, har et innhold på 2-8 % av disse mineralene. Dette er så lavt at det ikke synes å ha noen negativ innvirkning på sandens egenskaper til betongformål.

På grunn av mulige variasjoner både i mineralsammensetning og kornstørrelse ikke bare regionalt, men også helt lokalt, er det nødvendig med detaljerte kvalitetsundersøkelser før masser blir tatt ut og brukt til større byggearbeider både til vei- og betongformål.

#### ULIKE AREALBRUKSINTERESSER

Et særtrekk ved sand- og grusforekomstene er at de ofte er lokalisert i områder med stor kompleksitet når det gjelder arealbruk. Dette gir ofte konkrete konflikter om arealutnyttelsen.

Til de fleste sand-/grusforekomster som er aktuelle for uttak vil det også være knyttet andre arealbruksinteresser, f.eks.

- grunnvannsforsyning
- avfallsdeponering
- infiltrasjon av avløpsvann
- boligbygging
- industriområder
- veganlegg, jernbane, flyplasser
- jord-/skogbruk - dyrkingsjord
- vern av fortidsminner
- vern av klimaregulerende terrengformasjoner
- vern av naturvitenskapelige verdifulle forekomster
- landskapsvern, friluftsliv og rekreasjon.

I mange tilfeller vil en type arealbruk utelukke eller blokkere for annen arealbruk.

I Grusregisteret finner man opplysninger om forekomstens betydning som råstoffkilde, noe som kan være til hjelp når man i planleggingssammenheng skal vurdere utnyttelsen av arealer.




Fig. 10: Sand- og grusressurser - arealbruk

Eksempel på ulik arealbruk i et dalføre dominert av breelv- og elveavsetninger.

## FORVALTNING AV SAND OG GRUS

Med et årlig forbruk på 20 mill. m<sup>3</sup> i Norge, representerer sand- og grusressursene store nasjonale verdier. Med en gjennomsnittspris på 55 kr pr. m<sup>3</sup> gir dette en verdi på en milliard kroner, som er større enn brutto produksjonsverdien av alle andre mineralske råstoffer produsert på land i Norge i dag. Jern har til sammenligning en verdi på 650 mill. kr. (NOU 1984:8).

Flere offentlige utredninger i de siste år har tatt for seg problemene omkring forvaltningen og utnyttingen av våre sand- og grusressurser.

Særlig gjelder dette NOU 1980:18 om Sand og grus, men også NOU 1982:24 Industrimineraler, NOU 1983:46 Norsk Kartplan 2 og NOU 1984:8 Utnyttelse og forvaltning av mineralressurser.

Sand og grus må betraktes som en ikke-fornybar ressurs, selv om det i geologisk perspektiv stadig dannes nytt materiale. De geologiske betingelsene for dannelsen av sand og grus gjør at forekomstene er geografisk ujevnt fordelt. I mange kommuner er det derfor liten tilgang på sand og grus og behovet må dekkes ved import andre steder fra. Dette fører til lange transporter og fordyring av massene.

Det er et klart behov for å få en bedre planlegging av utnyttelsen av sand- og grusressursene. Dette har flere årsaker:

- Oversikten over reserver, forbruk og materialstrøm er mangelfull.
- Distriktsvis knapphet, generelt eller på enkelte kvaliteter.
- Arealkonflikter. Sand- og grusforekomstene er som nevnt godt egnet til flere ulike typer arealbruk, og dette gir lett konflikter mellom motstridende interesser for utnyttelse av grunnen.
- Miljøproblemer. Direkte ulemper for omgivelsene i form av støy, støv- og sandflukt, økt trafikkbelastning, fare for ulykker, skjemming av landskap/nærmiljø.

Utkast til ny minerallov (NOU 1984:8) foreslår at det innføres en drifts- og ervervkonsesjon på uttak av løsmasser. På denne måten kan myndighetene (Bergmester) sette vilkår for driften, bl.a. at det skal utarbeides driftsplaner og forekomsten sikres. Hvilke andre vilkår som skal stilles vil bero på forvaltningsmyndighetens skjønn. På denne bakgrunn skulle det

for de lokale myndigheter være mulig å løse miljø- og arealkonfliktene gjennom virkemidlene som en reguleringsplan og en driftsplan til sammen gir. Miljø- og arealkonflikter er problemer som må løses på det lokale plan ved tilpassing i hvert enkelt tilfelle.

Utnyttingen av sand og grus som en ikke-fornybar naturressurs er derimot en samfunnsoppgave som de sentrale og fylkeskommunale myndigheter har ansvar for. Prinsippet for en ressursforvaltning på nasjonalt og fylkeskommunalt hold kan bygge på tre hovedelementer:

- ressurskartlegging
- ressursregnskap
- ressursbudsjett

En kartlegging gir kunnskap om ressursenes størrelse og lokalisering. Dette er det av vital betydning å kjenne, også for å kunne planlegge arealbruken. Nedbygging av en grusforekomst vil kunne stenge for uttak av masser i uoverskuelig tid framover. Et ressursregnskap gir løpende informasjon om tilgang og bruk av ressursene, mens et budsjett vil bygge på framskrivinger av regnskapet under visse forutsetninger.

Det foreliggende Grusregisteret er å betrakte som det første ledet, ressurskartleggingen, i den skisserte ressursforvaltningen ovenfor. Grusregisteret gir oversikt over lokalisering, mengde, arealbruk, kvalitet m.m. for de forekomster som er registrert i fylket. Det er meningen at Grusregisteret ikke bare skal kunne nytes til å finne byggeråstoff i fylket, men også være til nytte i den øvrige fysiske planlegging av arealer i tilknytning til sand- og grusforekomstene.

## GRUSREGISTERET

### Organisering

Initiativet til å få utviklet og etablert Grusregisteret kom fra Miljøverndepartementet. Metodeopplegg for denne type undersøkelser ble utarbeidet for Miljøverndepartementet ved fylkeskartkontorene i Telemark og Vestfold i samarbeid med NGU. (Jfr. Miljøverndepartementets rapport T 521). I dag utføres registreringsarbeidet av NGU (jfr. NGU-rapport nr. 86.126).

Registeret er hittil etablert i følgende fylker: Telemark, Vestfold, Sogn og Fjordane, Oppland, Buskerud, Møre og Romsdal, Sør-Hedmark, Aust-Agder og Vest-Agder. Feltarbeidet pågår i Østfold, Akershus, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Finnmark. Hele landet ventes ferdig registrert i 1991.

Registeret er EDB-basert for enkelt å kunne oppdateres med nye opplysninger, og kunne kobles til andre typer data.

Driften av registeret med dataformidling overfor brukere blir lagt til det enkelte fylkeskartkontor, som vil ha oversikten over sitt fylke, mens NGU skal ha landsoversikten.

#### Innholdet i registeret

Grusregisteret lagrer og systematiserer data om forekomster av sand/grus og andre masser egnet til byggeråstoff. Registeret er først og fremst etablert for å gi en oversikt over ressurssituasjonen. Det inneholder en rekke opplysninger om den enkelte forekomst, men opplysningene er ikke omfattende nok for detaljert driftsplanlegging av større massetak.

Registeret omfatter fire materialtyper:

Sand/grus: Sorterte løsmasser anriket på sand og/eller grus, med lavt finstoffinnhold. Massene trenger vanligvis liten eller ingen foredling for å brukes til byggeråstoff.

Andre masser: Andre løsmasser, f.eks. skredmasser og morene. Disse krever vanligvis mer foredling hvis de skal nytes til annet enn fyllmasser.

Pukk: Masser som teknisk er knust ned fra fast fjell til ønskede kornstørrelser.

Skrotstein: Sprengt fjell som ikke er foredlet, f.eks. steintipper. Skrotstein kan være aktuelt som fyllmasse eller som råstoff for pukkverk.

Opplysningene som forekomstene viser:

- Betydning som råstoffkilde:  
areal og volum, kvalitet, nåværende masseuttak

- Andre bruksinteresser knyttet til ressursene:  
nåværende arealbruk på forekomsten, muligheter for grunnvannsuttak, verneverdi, andre konflikter ved uttak av masse
- Andre opplysninger:  
eiendomsinndeling innen forekomsten, referanser til tidligere undersøkelser av forekomsten.

Registeret gir dermed grunnlag for en helhetsvurdering av interesser knyttet til forekomsten.

Forekomster med volum mindre enn ca. 50 000 m<sup>3</sup> og mektighet mindre enn ca. 2 m over grunnvannsnivå er vanligvis ikke registrert med eget forekomstnummer og registreringsskjema. I områder med lite sand/grus er det imidlertid tatt med flere små forekomster enn i områder med rikelig sand-/grusressurser. Detaljeringsgraden av registreringene varierer altså noe i ulike deler av fylket. Tidsforbruket ved feltarbeidet er vurdert i forhold til betydningen av opplysningene.

Det er lagt opp til tre nivåer for feltregistreringene, avhengig av den enkelte forekomstens betydning som råstoffkilde (kvalitet, størrelse) og den distriktsvise knapphet:

- arealet av en forekomst avgrenses, og volumet beregnes
- arealet av en forekomst avgrenses, men volumet beregnes ikke (stiplet omriss)
- forekomsten punktlokaliseres.

Registreringen av "andre masser" er ikke gjort systematisk. I de fleste tilfellene er disse forekomstene små og vanskelig avgrensbare.

#### Datainnsamling

NGU foretok en spørreundersøkelse blant alle kommunene i Vest-Agder for å skaffe bakgrunnsmateriale for feltarbeidet. Det ble spurt om lokalisering av forekomster og produksjonsdata. Kommunene skulle også vurdere om de hadde tilstrekkelig tilgang på sand, grus og knuste steinmaterialer.


Statens Vegvesen i Vest-Agder stilte sitt arkiv over analyser og data fra undersøkte forekomster til disposisjon. Kart og litteratur fra NGU og andre institusjoner er også benyttet som grunnlagsmateriale (se litteraturliste). Viktigst er imidlertid flyfoto. Hele fylket er gjennomgått og

tolket på flyfoto i stereomontasje. De fleste forekomster er oppdaget på denne måten.

Feltarbeidet startet sommeren 1985, og det ble avsluttet i løpet av høsten 1986. Forekomstene er avgrenset på økonomisk kartverk i M 1:10 000 og dels 1:20 000. Fra massetak eller åpne snitt er det tatt prøver for bergarts- og mineralanalyse. Kornstørrelsesfordeling, lagdeling og mektighet av forekomsten er vurdert. Produksjonsforhold i massetak og arealbruksfordeling er registrert.

Arealbruksfordelingen omfatter seks typer arealbruk, skog, dyrka mark, bebygd areal, åpen fastmark og massetak. Alle forekomster som er arealberegnet er arealmessig fordelt på en eller flere av disse kategoriene.

I massetakene er det tatt polaroidbilde som viser snitt, mektighet, prøvelokalisering og evt. massetakets størrelse. Bildet følger registreringskjemaer og feltkart i det manuelle registeret.




SKJEMATISK OVERSIKT OVER GANGEN I  
DATAINNSAMLINGEN

Opplysninger utover "minsteregistreringen" er tatt med hvis forekomsten har stor betydning eller informasjonen er lett tilgjengelig. Data om eideomsforhold er registrert hvis det går fram av økonomisk kartverk. Registrert kan videre suppleres/ajourføres på et senere stadium av fylkeskartkontoret eller NGU. Supplering gjelder opplysninger om eier/bruker, produksjon, foredling, anvendelse, transport, priser og arealbruk etter endt masseuttak.

Det er generelt viktig at registeret oppdateres etter hvert som forekomstene blir grundigere undersøkt og driftsforholdene i massetakene forandrer seg.

Undersøkelsene baserer seg på enkle og raske vurderinger i felt uten hjelp av tekniske hjelpemidler for vurdering av bl.a. forekomstenes mektighet. Volumanslagene presenteres derfor som sannsynlighetsverdier.

## VOLUMANNSLAG FOR SAND-OG GRUSFOREKOMST



50% - VERDIEN (SANSYNLIG MENDE)  
BLIR BEREGNET UT FRA DET MEST  
SANSYNLIGE FALLET PÅ FJELLET

90% - VERDIEN (MINIMUMSOVERSLAG)  
BLIR BEREGNET UT FRA AT  
FJELLOVERFLÄTEN HAR MINDRE FALL  
ENN TERRENGET INDIKERER, OG AT DET  
ER OPPSTIKKENDE FJELLPARTIER UNDER  
FOREKOMSTEN

10% - VERDIEN (MAKSIMUMSOVERSLAG)  
BLIR BEREGNET UT FRA AT FJELLET  
HAR STØRRE FALL UNDER FOREKOMSTEN  
ENN TERRENGET RUNDT INDIKERER

## Databearbeidelse

Alle feltregistreringer er foretatt på forekomstskjema og massetaksskjema som ligger i det manuelle registeret. For hver avgrenset forekomst er det gjort volumoverslag ut fra beregnet areal og anslått gjennomsnittlig mektighet, fig. 9. Resultatet av bergarts- og mineraltellingene er ført inn i massetaksskjema. Etter hvert er data fra det manuelle registeret overført til EDB og lagret i en database.

Omrisset av forekomstene er digitalisert fra feltkartene og overført til databasen. Siden omrisset ligger lagret som koordinater kan det tas ut i varierende målestokker. Kombinert med opplysninger i det EDB-baserte registeret kan forskjellige typer kart tegnes ut ved hjelp av programstyrte plottere. Opplysningene er lagret kommunevis. Hver forekomst har et nummer innenfor kommunen. Kommune- og forekomstnummer identifiserer en forekomst.

## BRUK AV GRUSREGISTERET

### Inngangsnøkler og presentasjon

Fylkeskartkontorene og NGU har fått konsesjon fra Datatilsynet til å opprette Grusregister. Opplysningene i registeret er, i følge konsesjonen, tilgjengelig for alle som har et "berettiget" behov for dem.


Fylkeskartkontoret og NGU vil formidle opplysninger fra registeret innen fylket. NGU vil få et landsomfattende Grusregister og vil formidle oversikter på landsdels- og landsnivå.

Fylkeskartkontoret distribuerer grusressurskart i målestokk 1:50 000 (M711) og i liten målestokk som dekker hele fylket (1:250 000). Kartene kan brukes som inngangsnøkkelen til registeret. Hvis man er interessert i opplysninger om grusressursene innen et bestemt område, viser kartet om det finnes forekomster. De gir også opplysninger om størrelse, kvalitet, analyser og arealbruk. Mer detaljerte opplysninger kan en så finne i Grusregisteret. Kartene tegnes ut i svart/hvitt med en datastyrt plotter på topografisk kartgrunnlag, vedlegg 3.

Fra Grusregisteret kan en få flere typer utskrifter. Det kan foreløpig tas ut kopier av alle registrerte forekomstskjema. Det er laget standardiserte tabeller for å kunne kombinere ulike datatyper fra flere forekomster. Tabellene systematiserer data fra forekomster innenfor et geografisk avgrenset område, f.eks. kartblad, kommune eller en vilkårlig avgrensning med oppgitt hjørnekoordinater. Eksempler på forekomstskjema, massetaksskjema og tabeller er vist i vedlegg 1 og 2.

Del-rapportene (kommune-rapportene) gir en oversikt over registreringene i hver enkelt kommune. De inneholder også vurderinger om hvilke forekomster som er mest viktige som grusressurser, hvilke som bør undersøkes mer detaljert osv.

## EDB TIL LAGRING OG BRUK AV SAND-OG GRUSDATA



### Opplysninger fra Grusregisteret

Produkt/tjeneste	Fylkes- kartkontoret	NGU	Merknader
<hr/>			
- Kommunerapporter	x	x	
- Fylkesrapport	x	x	
- Oversiktskart 1:250 000	x	x	
- Grusressurskart 1:50 000 1)	x	x	
- Registreringsskjema med fullstendige opplysninger om forekomstene		x	
- Oversikter i standard tabeller	x	x	
- Manuelt arkiv (feltkart 1:5 000/1:10 000/1:20 000, registreringsskjema, evt. rapporter og andre opplysninger om forekomstene		x	bare til gj.syn
- Samtale med geolog vedr. spesielle forekomster, videre undersøkelser etc.	x 2)	x	
1) Dersom feltgrunnlaget er økonomisk kartverk kan grusressurskartene også framstilles i større målestokker, f.eks. 1:20 000.			
2) Gjelder i fylker med ansatt geolog.			

1021

# MARNARDAL KOMMUNE

### Konklusjon:

KOMMUNEN ER RELATIVT GODT FORSYNT MED SAND OG GRUS, MEN BERGARTSMATERIALET HAR NOE DÅRLIG KVALITET

Det er registrert et volum på 5.5 mill. m<sup>3</sup> sand og grus i kommunen. 12 % av forekomstenes areal er imidlertid båndlagt av bebyggelse/veier, og 45 % er båndlagt av dyrket mark. Forekomstene ligger i hoveddalføret, og de største volumene finnes mellom Mannflåvannet og Heddeland.

Forekomstene 6 Hommeneset, 10 Stræde og tildels 4 Kroken har et høyt innhold av grove fraksjoner, og massene kan brukes til ulike vegbygningsformål. Bergartsmaterialet er imidlertid sprøtt, og anbefales f.eks. ikke til slitedekker i veier med stor trafikketethet.

### Antall og beliggenhet:

DET ER REGISTRERT 10 SAND- OG GRUSFOREKOMSTER OG 1 PUKKVERK

Alle forekomstene ligger som større eller mindre terrasser i hoveddalføret, med unntak av forekomst 5, som er et massetak i morene ved Koland.

Forekomstene 2, 3 og 4 er rester etter større randdeltaer, som er bygget 2-3 m opp over den Marine grense. Forekomst 10 er en større sandurflate avsatt foran en isfront, over havnivået, mens forekomstene 1, 7, 8 og 9 er lateralterrasser/bresjøavsetninger. Forekomst 6 består både av en flat elveslette og et haugformet dødisterreng med dårlig sortert breelvmateriale.

I tillegg er en rekke mindre forekomster med usikker utbredelse og kvalitet registrert på kartet med bokstavsymboler. Ra-morenen krysser kommunen på tvers på strekningen Sollidal-Åpåse-Haraldstad-Stræde. Morenematerialet er sandig med tildels høyt innhold av stein og blokk, og kan nytties som fyllmasser og til lokale veiformål.

### Volum og arealbruk:

7 AV DE REGISTRERTE FOREKOMSTENE ER ANSLÅTT Å INNEHOLDE 5.5 MILL. M<sup>3</sup> SAND OG GRUS

Forekomstene 3 Mjåland og 10 Straede inneholder henholdsvis ca. 2 og 1 mill. m<sup>3</sup> sand og grus, og må betegnes som kommunens viktigste reserver. På forekomst 3 kommer imidlertid grusdriften i konflikt med dyrka mark, som utgjør 75 % av arealet (Tab. 2.1).

Fjell i dagen er observert flere steder på forekomsten, og volumanslaget er derfor noe usikkert.

Forekomst 2 Heddeland inneholder også store mengder sand og grus, men mektigheten er i gjennomsnitt bare 2-3 m over grunnvannsspeilet. Store arealer er bebygd og dyrket opp (Tab. 2.1).

Forekomstene 1, 4, 6 og 7 er relativt små, med beregnet volum fra 180 000 m<sup>3</sup> til 380 000 m<sup>3</sup> sand og grus. Dyrka mark dominerer, mens 10-15 % av arealene er bebygd. På forekomst 6 Hommeneset er 95 % av arealene skogdekket (Tab. 2.1).

Det er ikke utført volumberegninger for forekomstene 8 Trygsland eller 9 Hesså p.g.a. høyt innhold av ensgradert finsand. Heller ikke morenemateriale i forekomst 5 Koland er volumberegnet.

#### Kvalitet og egnethet:

##### SPRØTT BERGARTSMATERIALE BEGRENSER BRUKEN AV MASSENE TIL HØYVERDIGE FORMÅL

Med unntak av forekomstene 8 og 9, inneholder forekomstene i Marnardal en god del grus. Forekomstene 6 Hommeneset og 10 Straede inneholder også til dels mye grovt materiale, men massene i forekomst 6 er relativt korttransportert og av den grunn noe dårlig sortert.

Det er gjort bergartsanalyser i fraksjonen 8-16 mm fra tre forekomster som viser at bergartene består av ulike typer grovkornete gneiser og granitter. 85-88 % av bergartskornene er klassifisert som svake p.g.a. stor sprøhet (Tab. 4). Kornene er lite motstandsdyktige mot slagpåkjenninger, og smuldrer forholdsvis lett opp i de enkelte mineralkornene. Fallprøver utført av Statens Vegvesen fra pukkverket ved Sølkrona (forekomst 511) viser relativt høye sprøhetstall, materialet klassifiseres i klasse 3 i sprøhets- og flisighetsdiagrammet. Til bære- og slitelag i veier med stor trafikkbelastning vil materialet neppe ha tilstrekkelig god kvalitet.

Mineralanalyser i fraksjonene 0.5-1.0 mm og 0.125-0.250 mm viser fra 1-6 % talte, frie glimmerkorn, noe som ikke vil ha innvirkning på massenes kvalitet til betongtilslag.

Massene i forekomstene 8 og 9 er høyst sannsynlig for finkornete og ensgraderte til å kunne brukes til tekniske formål.

Videre undersøkelser:

POTENSIELLE PUKKFOREKOMSTER OG ENKELTE SAND- OG GRUSFOREKOMSTER BØR UNDERSØKES NÆRMERE

Kommunen har flere store grusreserver som kan brukes til bl.a. veg- og betongformål. For å finne fram til de forekomstene som er best egnet til uttak av sand og grus, bør det utføres mer detaljerte undersøkelser som gir opplysninger om kvalitet, volum og egnethet. Det kan være aktuelt å se nærmere på forekomstene 1-4, 6 og 10.

En detaljert kartlegging av bergartene med tanke på å lokalisere pukkforekomster med god kvalitet, som kan nytes til høyverdige formål, kan også være aktuelt i Marnardal.

GRUSREGISTERET - TABELL 2.1  
KOMMUNEOVERSIKT - FOREKOMSTER  
m/KARTBLADNAVN (M711)

Søkekriterier  
KOM 1021 marnardal

Utskriftsdato : 21. 4.86

FOREKOMST	KARTBLAD-	MATR. ! SANS. ! VOLUM ! AREAL ! AREALBRUK I %
NR. ! NAVN	! NAVN	! TYPE ! MEKT. ! 1000M3 ! 1000M2 ! M ! B ! D ! S ! A

MARNARDAL

1 NOME	Mandal	S	10	377	37	5	15	70	10	0
2 HEDDELAND	Mandal	S	2	1379	689	10	20	40	30	0
3 MJÅLAND	Mandal	S	5	1934	386	5	5	75	15	0
4 KROKEN	Mandal	S	2	186	93	5	15	65	15	0
5 KOLAND	Bjelland	S	0	0	0	0	0	0	0	0
6 HOMMENESET	Bjelland	S	3	369	123	5	0	0	95	0
7 BJELLAND	Bjelland	S	2	271	135	0	10	90	0	0
8 TRYGSLAND	Bjelland	S	0	0	0	0	0	0	0	0
9 HESSÅ	Bjelland	S	0	0	0	0	0	0	0	0
10 STRÆDE	Bjelland	S	3	990	330	5	5	10	80	0
511 SOLKRONA	Bjelland	P	0	0	0	0	0	0	0	0
SUM 11	2			5510	1797	7	12	45	37	0

TABELLFORKLARING

KARTBLADNAVN = Navn på sand- og grusressurskartet i målestokk  
1 : 50000.

MATR.TYPE = Materialtype; S = sand og grus, P = pukk, A = andre materialer.

SANNS. MEKT. = Anslag for den mest sannsynlige mektighet i meter.

VOLUM = Anslått volum i hele 1000m<sup>3</sup> basert på den midlere (50% sannsynlige) mektighet og ressursarealet (totalarealet evt. fratrukket massetaksarealet).

AREAL = Totalareal i hele 1000m<sup>2</sup> (fratrukket et evt. massetaksareal).

AREALBRUK I % = Anslått arealbruksfordeling i % av totalarealet;  
M = Massetak, B = bebyggelse og kommunikasjon, D = dyrka mark,  
S = Skog, A = annet..

SUM = Antall forekomster, antall ulike kartblad, volum, areal og gjennomsnittsverdien for arealbruk.

GRUSREGISTERET - TABELL 3  
KOMMUNEOVERSIKT - MASSETAK

Søkekriterier  
KOM 1021 MARNARDAL

Utskriftsdato : 21. 4.86

FOREKOMST NR. NAVN	MASSETAK!	DRIFT!	KORNSTØRRELSE!	FOREDL.	KONFLIKT	ETTER- BEH.
	! NR. !	! Bl! St! G! S! PROD. !				

MARNARDAL

2 HEDDELAND	2	D	15	85		
2	1	D	3	25	72	
3 MJALAND	1	D	2	28	70	J
4 KROKEN	1	S	5	25	70	V
5 KOLAND	1	S	5	20	70	
6 HOMMENESET	1	I	5	15	50	
7 HESSÅ	1	I		1	99	
8 STRÆDE	1	I	15	15	40	V
511 SOLKRONA	1	D				
SUM 11	9		3	5	25	68

TABELLFORKLARING

DRIFT = Driftsforhold : D = drift, I = ikke drift,  
S = sporadisk drift, N = nedlagt.

KORNSTØRRELSE = Visuell vurdering av kornstørrelsесfordelingen i et typisk snitt. Bl = prosentandel blokk ( $d > 256\text{mm}$ ), St = prosentandel stein ( $256\text{mm} > d > 64\text{mm}$ ), G = prosentandel grus ( $64\text{mm} > d > 2\text{mm}$ ), S = prosentandel sand, silt og leir ( $d < 2\text{mm}$ ).

FOREDLING/PRODUKSJON: S = sikting, V = vasking, K = knusing,  
A = asfaltverk/oljegrusproduksjon,  
B = betong/betongvareproduksjon, X = annet.

KONFLIKT = konfliktsituasjoner :

B = bebyggelse, I = industri, U = institusjon O = militært område, V = veg, T = jernbane, P = flyplass, L = kraftlinje, J = jordbruk, Y = mulig nydyrkingsområde S = skogbruk, E = eksisterende grunnvannsuttak, R = resipient, G = mulig fremtidig grunnvannsuttak, F = fredet areal, A = vernet areal, N = fornminner, D = mulig verneverdi, M = miljøulemper, K = klimaendring, H = forurensning av vassdrag, X = andre.

ETTERBEHANDLING : U = utført, D = delvis utført, P = planlagt, T = utelatt.

SUM = antall forekomster, antall massetak og prosentfordeling av kornstørrelse beregnet etter volum.

GRUSREGISTERET - TABELL 4  
KOMMUNEOVERSIKT - ANALYSER

Søkekriterier  
KOM 1021 MARNARDAL

Utskriftsdato : 4.12.86

EOREKOMST	!MASSE- ! BERGARTSINNH.			! MINERALINNHOLD ! SPRØH.&FLIS.				
NR. NAVN	!TAK NR.! AA BB CC NN			G	A	B M A!	S	F

MARNARDAL									
2 HEDDELAND	1	11	85	4	1	99	1	14	85
3 MJALAND	1	8	88	4	1	99	6	24	70
10 STRÆDE	1	9	88	3	2	98	6	24	70
511 SOLKRONA	1						52.0	1.36	
SUM 11		9							

TABELLFORKLARING

BERGARTSINNH.% = Visuelt anslag for bergartkornenes styrke (8-16mm)

AA = Prosentandel av 'meget sterke korn', BB = Prosentandel av 'sterke korn', CC = Prosentandel av 'svake korn', NN = Prosentandel av 'meget svake korn'. En del analyser er utført uten skiller mellom gruppe AA og BB.

MINERALINNH.% = Visuell bedømmelse av mineralinnhold i sandfraksjonen

Fraksjon 0.5-1.0mm:

G = Glimmer (frikorn), A = Andre korn (vesentlig bergartsfragmenter samt frikorn av kvarts feltspat).

Fraksjon 0.125-0.250mm:

B = Glimmer (frikorn) og skiferkorn, M = 'Mørke' mineraler (amfibol, pyroksen, epidot og granat), A = Andre korn (vesentlig kvarts og feltspat).

SPRØH. & FLIS = Sprøhets- og flisighetstallet.

Her føres resultatet fra analyser i fraksjonen 8-11.2 mm med 50% laboratoriepukket materiale.

SUM = Antall forekomster og massetak.

## LITTERATUR

Andersen, B. G. - 1960: Sørlandet i sen- og postglasial tid.  
NGU NR. 210.

Falkum, T. - 1982: Mandal. Berggrunnsgeologisk kart 1:250 000.  
Nor. geol. unders.

Hansen, H. J. og Wolden, K. - 1986: Ressursregnskap for sand, grus og pukk  
i Aust-Agder fylke 1985. NGU-rapport nr. 86.163.

Holmsen, G. - 1965: Nyttbare sand- og grusforekomster i Syd-Norge. Del 1.  
NGU NR. 233.

Holmsen, G. - 1971: Nyttbare sand- og grusforekomster i Syd-Norge. Del 2.  
NGU NR. 271.

Holmsen, G. - 1979: Grunnlag i kvartærgeologi. NGU NR. 347.

Holtedal, O. (ed.) - 1960: Geology of Norway. NGU NR. 208.

Huseby, S. - 1978: Austad. Beskrivelse til vannressurskart 1512-I,  
1:50 000. Nor. geol. unders.

Huseby, S. - 1979: Hægebostad. Beskrivelse til vannressurskart 1411-IV,  
1:50 000. Nor. geol. unders.

Huseby, S. - 1982: Mandal m/Ryringen. Beskrivelse til vannressurskart  
1411-II, 1:50 000. Nor. geol. unders.

Huseby, S. - 1982: Lyngdal m/Lindesnes. Beskrivelse til vannressurskart  
1411-III, 1:50 000. Nor. geol. unders.

Neeb. P.-R. - 1986: NGUs etablering av et EDB-basert Grus- og  
Pukkregister. Fjellsprengningsteknikk, bergmekanikk og geotek-  
nikk. Tapir 1986.

Miljøverndepartementet, Ressursavdelingen - 1981: Grusregisteret. Del 1.  
RAP. T - 521.

NOU 1980:18; Sand og grus. Univ.forlaget.

NOU 1984:8 ; Utnyttelse og forvaltning av mineralressurser. Univ.forlaget.

Padget, P. - 1984: Arendal. Berggrunnsgeologisk kart 1:250 000.  
Foreløpig utgave. Nor. geol. unders.

Sigmond, E. M. - 1975: Sauda. Berggrunnsgeologisk kart 1:250 000.  
Nor. geol. unders.


Sigmond, E. M., Gustavson, M., Roberts, D. - 1984: Berggrunnskart over  
Norge - M 1:1 mill. Nor. geol. unders.

Statens Vegvesen - 1984: Vest-Agder. Diverse analyseresultater.  
Distriktslaboratoriet.

Stokke, J. A. - 1986: Grus- og Pukkregisteret. Innhold og feltmetodikk.  
NGU-rapport nr. 86.126.

# VEST-AGDER

## KARTLAGTE SAND- OG GRUSFOREKOMSTER OG REGISTRERTE PUKKVERK



### TEGNFORKLARING

#### REGISTRERTE SAND OG GRUSFOREKOMSTER

- volumestimat mangler
- < 0.1 m<sup>3</sup>
- 0.1 – 1.0 m<sup>3</sup>
- 1.0 – 5.0 m<sup>3</sup>
- > 5.0 m<sup>3</sup>

#### REGISTRERTE PUKKVERK OG AKTUELLE UTTAKSOMRÅDER FOR PUKK

- ▲ uttak med kontinuerlig drift
- uttak med sporadisk drift eller nedlagte steinbrudd
- ▼ prøvetatte forekomster og/eller observasjonslokalliteter

10 km

**NGU**  
NORGES GEOLOGISKE  
UNDERSØKELSE  
LØSMASSEAVDELINGEN

Referanse til kartet:  
GRUSREGISTERET DES. 1986

# FOREKOMSTREGISTER

vedlegg 1.1

Fylke-komm.nr.: <u>10.10</u> Forekomst nr.: <u>5</u> Forekomst navn: <u>G.R.U.S.MO.</u>	År - måned - dato: <u>86.07.10</u> Inventør: <u>N.G.U K.W.</u> Kode for offentlighet: <u>□</u>
KBL(DØK): <u>C.K.L.1.0.7.1.0.8 C.K.1.1.1.-5-1</u> <u>C.K.L.1.0.9.1.1.0 C.K.1.1.1</u> <u>          </u> <u>          </u> <u>          </u> <u>          </u>	KBL(M711): <u>15.1.2.-4 15.12.-1</u> <u>          </u> <u>          </u> <u>          </u> <u>          </u>
KOORD.(NGO): Y = <u>48200</u> X = <u>156300</u>	<b>AREAL OG VOLUM</b> Totalt areal ..... <u>230.200</u> m <sup>2</sup> <b>Gj.sn. mektigheter</b> <b>volum</b> Sanns. (50%): <u>7</u> m ..... <u>1611400</u> m <sup>3</sup> Min. (90%): <u>5</u> m ..... <u>1151000</u> m <sup>3</sup> Maks. (10%): <u>12</u> m ..... <u>2762400</u> m <sup>3</sup>  <b>NÅVÆRENDE AREALBRUK</b> 2 922 Massetak: ..... m <sup>2</sup> <u>10</u> % 2 99 Bebyggelse: ..... m <sup>2</sup> <u>5</u> % 2 93 Kommunikasj.: ..... m <sup>2</sup> <u>5</u> % 3 99 Dyrka mark: ..... m <sup>2</sup> <u>20</u> % 4 99 Skog: ..... m <sup>2</sup> <u>55</u> % 6 99 Åpen fastm.: ..... m <sup>2</sup> <u>5</u> % 9 99 Ufordelt: ..... m <sup>2</sup> ..... %
<b>REGULERINGSPLANER:</b> <u>          </u> <u>          </u>	

## RAPPORTER/LITTERATUR SOM OMHANDLER FOREKOMSTEN

Rapport nr.	Rapport navn	År	Unders.	Analyser
<u>100-00A</u>	<u>S.T. VEGV. AUST-AGDER</u>	<u>80</u>	<u>SBP</u>	<u>KFMPH</u>
<u>NGU-85-00</u>	<u>WOLDEN: GRUSMO GRUSFOREKOMST</u>	<u>85</u>	<u>KUSBJP</u>	<u>KFPMRSHB</u>
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

BESKRIVELSE: STOR BREELVTERASSE VED GRUSMO.

Foto Ja(J), Nei(N): .....

AVSETNINGEN ER EN AV DE FOR GRUSFORSYNINGEN I KOMMUNEN.  
DET ER ET MASSETAK I DEN NORDLIGSTE DELEN HVR MASSENE  
ER GROVE OG GODT EGNET TIL VEI OG BETONGFORMÅL. DE LAVERE  
ELVESLETTENE MOT SYD ER MER FINKORNIGE OG IKKE SÅ GOOT  
EGNET TIL TEKNISK BRUK. DENNE DELEN ER DYRKA OPP OG  
RICKSVEIEN GÅR OVER FOREKOMSTEN. I NORD ER FOREKOMSTEN  
FØR DET MESTE DEKKET AV SKOG. FOREKOMSTEN ØVR UNDER-  
SØKES MER DETALJERT.

MERKNADER: .....

## MASSETAKSREGISTER

Vedlegg 1.2

Forek.nr.: 5 Mt.nr.: 1 Gnr.: 100 Bnr.: 1 Flere einedommer. J N N  
 Kbl. (M711): 1512-4 Koord. (UTM): 32V 04269, 65292  
 Kbl. (DOK): CKL 109 110

Koord (NGO): Y = , X = ,

Bruker: \_\_\_\_\_  
Adresse: \_\_\_\_\_

DIRFTSFORHOLD	FORDELING I MT	ETTER-BEHANDLING
I drift:	(D)	Sikring
Sporadisk drift:	S	Vaskning
Nedlagt:	N	Knusing
		Asfall:
		Belong:
		Annel:

Anslått kornfraksjonsfordeling: Sand: 50 % Grus: 38 % Stein: 10 % Blokk: 2 %

Beskrivelse: MASSETAKET HAR EN DRIFTSHØYDE PÅ CA. 6M. ØVERST ER ET CA. 1M MERTIG TOPPLAG MED GROV GRUS OG STEIN. VIDERE SKRÅSTILTE LAG MED SAND OG GRUS. MOT BUNNEN AV SNITTEI BLIR MASSENE MER SANDIGE. SØR I MASSETAKET ER DET ET GROVT LAG OGSA MOT BUNNEN (BILDE 2) MASSENE SYNES Å EGNE SEG ØAUE TIL VEI OG BETONGFORMÅL. DET ER KNUSE OG SIKTEVERK I TAK

Skisse/foto av snitt nr.: 1

0910-5.1



Fotoretning: mot VEST


Prøve nr.: 5.1 1/2

Koord.: \_\_\_\_\_

Journal nr.: \_\_\_\_\_

Kommentarer: MASSETAKET SETTI MOT VEST. TOPPLAG MED GRUS OG STEIN DEGTE ETTER GRUS OG SAND. SAND I BUNNEN PROVE TIL BERGARTSTELLING 1 - " MINERALTELLING 2

nr.: 2



Fotoretning: mot

Prøve nr.: \_\_\_\_\_

Koord.: \_\_\_\_\_

Journal nr.: \_\_\_\_\_

Kommentarer: BILDET ER TATT TIL VENSTRE FOR BILDE 1 OG VISER ET GROVT GRUSIG-STENIG LAG NÆR SÅLEN I MASSETAKET

GRUSREGISTERET - TABELL 1  
FYLKESOVERSIKT

Søkekriterier  
FYL 10 VEST-AGDER

Utskriftsdato : 21.11.86

KOMMUNE			FOREKOMSTER		VOLUM		AREALBRUK I %					
NR.	NAVN	REGI-	VOLUM	STRERTE	BEREGRNEDE	MILL M3	M	B	D	S	A	
				Grus Pukk!	Grus Pukk!							
1001	KRISTIANSAND S	5	3	5		4.3	2	62	21	15	0	
1002	MANDAL	3	1	3		2.0	13	15	56	15	0	
1003	FARSUND	14	2	8		3.2	8	7	65	10	10	
1004	FLEKKFJORD	15		8		12.6	3	34	50	12	0	
1014	VENNESLA	14		11		9.4	5	35	34	26	0	
1017	SONGDALEN	8	1	5		3.9	5	54	38	3	0	
1018	SØGNES	5		2		.7	18	37	18	27	0	
1021	MARNARDAL	10	1	7		5.5	7	12	45	37	0	
1026	ASERAL	27		18		7.4	2	15	50	33	0	
1027	AUDNEDAL	11	1	7		5.5	0	24	21	55	0	
1029	LINDESNES	7		7		2.0	9	15	66	10	0	
1032	LYNGDAL	14		8		11.4	4	25	50	20	1	
1034	HÆGEBOSTAD	9		8		7.4	5	17	33	45	0	
1037	KVINESDAL	15	1	11		7.0	4	18	66	12	0	
1046	SIRDAL	25		13		5.5	4	21	50	21	3	
<b>SUM</b>			<b>15</b>	<b>182</b>	<b>10</b>	<b>121</b>	<b>87.7</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>46</b>	<b>24</b>	<b>1</b>

## TABELLFORKLARING

SUM = Antall kommuner, antall registrerte forekomster, antall volumberegnede forekomster, volum og gjennomsnittlig arealbruk i %.

AREALBRUK I % = Anslått arealbruksfordeling i % av forekomstarealet.

M = massetak, B = bebyggelse og kommunikasjon, D = dyrka mark,

S = skog, A = annet.

GRUSREGISTERET - TABELL 2.2  
Kommuneoversikt - Forekomster  
m/UTM-Koordinater

Søkekriterier  
KOM 1021 MARNARDAL

Utskriftsdato : 27. 1.87

FOREKOMST NR.!NAVN	KOORDINATER !SONE ØST	MATR.!SANS. NORD !TYPE	VOLUM !MEKT. !1000M3!1000M2!	AREAL !% M ! B ! D ! S ! A	
<hr/>					
1 NOME	32 415700 6446500	S	10 377	37 5 15 70 10 0	
2 HEDDELAND	32 413000 6451600	S	2 1379	689 10 20 40 30 0	
3 MJÅLAND	32 412700 6456000	S	5 1934	386 5 5 75 15 0	
4 KROKEN	32 413200 6453300	S	2 186	93 5 15 65 15 0	
5 KOLAND	32 418700 6472600	S	0 0	0 0 0 0 0 0	
6 HOMMENESET	32 413100 6479100	S	3 369	123 5 0 0 0 95 0	
7 BJELLAND	32 413900 6472300	S	2 271	135 0 10 90 0 0	
8 TRYGSLAND	32 413800 6470300	S	0 0	0 0 0 0 0 0	
9 HESSÅ	32 413800 6469600	S	0 0	0 0 0 0 0 0	
10 STRÆDE	32 413500 6461400	S	3 990	330 5 5 10 80 0	
511 SOLKRONA	32 413800 6461700	P	0 0	0 0 0 0 0 0	
<hr/>					
SUM 11	2		5510 1797	7 12 45 37 0	

---

TABELLFORKLARING

KOORDINATER = Denne forekomstens UTM-koordinat, angitt ved sone, øst- og nord-verdier.

MATR.TYPE = Materialtype; S = sand og grus, P = pukk, A = andre materialer.

SANNS. MEKT. = Anslag for den mest sannsynlige mektighet i meter.

VOLUM = Anslått volum i hele 1000m<sup>3</sup> basert på den midlere (50% sannsynlige) mektighet og ressursarealet (totalarealet evt. fratrukket massetaksarealet).

AREAL = Totalareal i hele 1000m<sup>2</sup> (fratrukket et evt. massetaksareal).

AREALBRUK I % = Anslått arealbruksfordeling i % av totalarealet;  
M = Massetak, B = bebyggelse og kommunikasjon, D = dyrka mark,  
S = Skog, A = annet.

SUM = Antall forekomster, antall ulike kartblad, volum, areal og gjennomsnittsverdien for arealbruk.

GRUSREGISTERET - TABELL 5  
FYLKESOVERSIKT

Søkekriterier  
KOM 1021 MARNARDAL

Utskriftsdato : 23. 1.87

Ressurstype	Avsetningstype	Ant.	Volum	% av tot
		forek.	mill. m <sup>3</sup>	ant. forek.
<hr/>				
Sorterte sand-	Breelvsavsetninger(B)	7	4	64
og grus-	Elveavsetninger(E)	0	0	0
avsetninger	Breelv- og Elveavs.	1	0	9
	Strandavsetninger(U)	0	0	0
<hr/>				
Dårlig	Morenemateriale(M)	0	0	0
sorterte sand-	Morene- og breelvavs.	2	0	18
og grusavsetn.				
<hr/>				
Steinfyllinger	tipper	0	0	0
<hr/>				
Pukk	fastfjelluttak	1	0	9
<hr/>				
Sum		11		
<hr/>				

**GRUSREGISTERET - TABELL 6**  
**OPPLYSNINGER OM EN FOREKOMST**  
**UTSKRIFT FRA FELTSKJEMAET**

**NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE**

Utskriftsdato : 26. 1. 87  
 Ajourført dato :

---

Kommunenavn :	MARNARDAL	Forekomstnavn :	HEDDELAND
Kommunenummer :	1021	Inventør :	NGU KRR
Forekomstnummer :	2	Registreringsdato:	850629
		Kartbl.nr.(M711) :	1411-2
Antall massetak :	2	Koordinat(UTM) :	Sone Øst Vest
			32 4130 64516

---

Materialtype : SAND/GRUS  
 Forekomsttype : BREELVAVSETNING

---

Mektighet i meter	!	Arealfordeling i %
Midlere (50% sannsynlig) :	2	Massetak : 10
Maksimal (10% sannsynlig) :	4	Bebygelse : 20
Minimal (90% sannsynlig) :	2	Dyrka mark : 40
	!	Skog : 30
	!	Annet : 0

---

Forekomstareal i 1000m <sup>2</sup> (fratrukket et evt. massetaksareal) :	689
Sannsynlig volum i 1000m <sup>3</sup>	: 1379

---

Konfliktsituasjoner ved uttak i forekomsten :  
 BEBYGGELSE, JORDBRUK, VEG, INDUSTRI, JERNBANE

---

**Beskrivelse :**

FOREKOMSTEN ER TROLIG ET SANDURDELTA SOM STREKKER SEG OVER ET OMRÅDE PÅ 1,5 x 0,5 KM. ET GROVT, HORISONTALT OVERFLATELAG PÅ 0,5-1,5 M, LIGGER OV 1-2 M MED GRUSHOLDIG SAND I SKRÅLAG/SKRÅSKIKT. MEKTIGHeten ER 2-3 M OVER GRUNNVANNSTAND.

GRUSREGISTERET - TABELL 7  
OPPLYSNINGER OM ET MASSETAK  
UTSKRIFT AV FELTSKJEMAET

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Utskriftsdato : 26. 1.87  
Ajourført dato :

Kommunenavn :	MARNARDAL	Inventør :	NGU KRR
Kommunenummer :	1021	Dato :	850629
Forekomstnummer :	2	Kartbl.nr.(M711) :	14112
Forekomstnavn :	HEDDELAND	Koordinat(UTM) :	Sone Øst Vest
Massetaksnr. :	1		32 4130 64516

Driftsforhold :

I DRIFT

Gårds og bruksnummer der massetaket ligger :

Gnr. : 84 Bnr. : 5

Strekker massetaket seg over flere eiendommer (J/N) ?

Navn på bruker/produsent i massetaket :

Adresse :

Anslått kornstørrelsesfordeling i %			
(0.0063 - 2mm)	(2 - 64mm)	(64 - 256mm)	(> 256mm)
Sand : 72	Grus : 25	Stein : 3	Blokk :

Sprøhet- og flisighetstall

Prøvenummer :	Flisighet :
Kornfraksjon :	Sprøhet :
% laboratoriepukket :	Pakningsgrad :
	Korrigert sprøhet :

Bergartsinnhold ! Mineralinnhold

Prøvenummer : 1	Prøvenummer : 2	Prøvenummer : 3
Kornfraksjon ! 8-16 mm	Kornfraksjon ! 0.5-1 mm	Kornfraksjon ! 0.125-0.25 mm

Bergarter i %	Mineraler i %	Mineraler i %
Meget sterke :	Glimmer : 1	Glimmer/skifer : 1
Sterke : 11	Andre : 99	Mørke : 14
Svake : 85		Andre : 85
Meget svake : 4		

Beskrivelse :

3-4 M HØYT SNITT I LITE MASSETAK. CA. 1 M GRUSHOLDIG SAND (TOPPLAG) LIGGER OVER LAGDELT OG SKIKTET SAND. INNHOLDET AV GRUS VARIERER FRA LAG TIL LAG. ENKELTE FINSANDLAG FINNES OGSA. GRUSEN ER RUNDA OG GODT RUNDA. MATERIALET ER ALTSÅ NOE GROVERE ENN DET VI ELLERS FINNER I DALENE, MEN INNEHOLDER EN DEL HUMUS I DE ØVRE DELENE.

