

NGU-rapport nr. 86.104

Grusregisteret i
Åseral kommune,
Vest-Agder fylke



Norges geologiske undersøkelse

Leiv Eirikssons vei 39, Postboks 3006, 7001 Trondheim - Tlf. (07) 92 16 11
Oslokontor, Drammensveien 230, Oslo 2 - Tlf. (02) 50 25 00

Rapport nr. **86.104**

ISSN 0800-3416

Åpen/XXXXXX

Tittel:

Grusregisteret i Åseral kommune

Forfatter:

Hans Jørund Hansen

Forskriftsgiver:

Fylkeskartkontoret i Vest-Agder
NGU

Fylke:

Vest-Agder

Kommune:

Åseral

Kartbladnavn (M. 1:250 000)

Mandal

Kartbladnr. og -navn (M. 1:50 000)

| | | | |
|--------|----------|--------|------------|
| 1411-1 | Bjelland | 1412-3 | Fjotland |
| 1412-1 | Austad | 1412-4 | Kvifjorden |
| 1412-2 | Åseral | | |

Forekomstens navn og koordinater:

Sideantal: 51

Pris: 100,-

Antall platte: 2

Feltarbeid utført:

august 1986

Rapportdikt:

desember 1986

Prosjektkontoret:

Knut Wolden

Sammendrag:

Grusregisteret i Åseral kommune er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register for å gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til sand- og grusressursene.

Materialets egenskaper til vei- og betongformål er vurdert ved visuelle metoder. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller.

Det er kartlagt 28 forekomster i kommunen med et samlet volum på 7.3 mill. m³. For de vanligste bruksområder er Åseral godt forsynt med masser.

Innledning

Ingeniørgeologi

Kvalitetsundersøkelse

Ressurskartlegging

Volum

Grusregister

Fagrapport

FORORD

Forberedelsene til etablering av Grusregisteret i Vest-Agder startet vinteren 1985 med gjennomgåelse av tilgjengelige opplysninger fra geologisk litteratur og flybildetolkning. Feltregistreringene ble utført feltsesongen 1985 og 1986. Senere er alle innsamlede data bearbeidet og lagt inn på EDB.

Flere personer fra NGU og fylkeskartkontoret har vært engasjert i dette arbeidet både under feltarbeidet og bearbeidingen av materialet.

Ivar J. Jansen fra fylkeskartkontoret i Aust-Agder har flybildetolket hele fylket. Ansvarlige for feltregistreringene har vært Knut R. Robertsen, Hans Jørund Hansen og Knut Wolden.

Laboratorieanalyser av prøvematerialet er utført av Anne Nordtømme, Johan Andersen og Asbjørn Bremseth. Klassifisering av bergarter og mineraler er utført av Knut R. Robertsen og Dag Ottesen. Janne Grete Wesche har overført data fra det manuelle registeret til EDB, digitalisert kartdata og vært ansvarlig for tekstbehandling av rapporten.


Undertegnede takker alle for vel utført arbeid.

Trondheim, 15. desember 1986



Peer-R. Neeb

seksjonssjef



Knut Wolden

prosjektleder



Hans Jørund Hansen

saksbehandler/forfatter

| | Side |
|---------------------------------------|------|
| FORORD | |
| INNHOLD | |
| KONKLUSJON | 6 |
| BERGGRUNNEN | 12 |
| KVARTÆRGEOLOGIEN | 14 |
| JORDARTENES EGNETHET SOM BYGGERÅSTOFF | 18 |
| - breelvavsetninger | 18 |
| - elveavsetninger | 18 |
| - strandavsetninger | 19 |
| - morene | 19 |
| DANNELSE AV SAND OG GRUS | 20 |
| - korte trekk fra dannelseshistorien | 20 |
| SAND- OG GRUSKVALITETER | 21 |
| ULIKE AREALBRUKSINTERESSER | 22 |
| FORVALTNING AV SAND OG GRUS | 24 |
| GRUSREGISTERET | 25 |
| - Organisering | 25 |
| - Innhold i registeret | 26 |
| - Datainnsamlingen | 27 |
| - Databearbeidelse | 31 |
| BRUK AV GRUSREGISTERET | 31 |
| - Inngangsnøkler og presentasjon | 31 |

| | |
|--|----|
| ÅSERAL KOMMUNENE | 34 |
| - Konklusjon | 35 |
| - Antall, volum og beliggenhet | 35 |
| - Kvalitet | 36 |
| - Bruksområder og videre undersøkelser | 36 |
| LITTERATUR | 42 |

TEGNINGER

86.111-01 Vest-Agder fylke. Registrerte sand- og grusforekomster
og lokalisering av pukkverk.

VEDLEGG

- 1.1 Forekomstskjema
- 1.2 Massetaksskjema
- 2.1 Tabell 1
- 2.2 Tabell 2.2
- 2.3 Tabell 5
- 2.4 Tabell 6
- 2.5 Tabell 7
- 3 Sand- og grusressurskart 1412-2 Åseral

KONKLUSJON

Etablering av Grusregisteret i Vest-Agder startet i 1985 etter avtale mellom Statens kartverk (Fylkeskartkontoret i Vest-Agder), Vest-Agder fylkeskommune, Miljøverndepartementet og NGU.

I løpet av 2 feltsesonger med totalt 85 feltdøgn er det registrert i alt 182 sand- og grusforekomster og 10 pukkverk i Vest-Agder. Av disse er 121 forekomster volumberegnet og gir samlet en reserve på 88 mill. m^3 sand og grus. Dette tilsier at Vest-Agder har lite sand og grus i forhold til andre fylker hvor Grusregisteret er etablert. Til sammenligning har Buskerud 1.2 milliard, Oppland 980 mill., Telemark 698 mill., Møre og Romsdal 507 mill., Sogn og Fjordane 370 mill., Aust-Agder 217 mill. mens Vestfold kun har 41 mill. m^3 sand og grus. Volum pr. km^2 og innbygger i de samme fylkene er vist i fig. 1.




Fig.1

Forekomstene er ujevnt fordelt og brukbarheten til teknisk formål varierer en del innen fylket.

De største konsentrasjonene av sand og grus ligger sør for Raet i dalførerne langs Otra, Manndalselva, Audna, Lyngdalselva, Kvina og Sira, og der dalene munner ut i store sjøer som i Sirdal og Åseral, tegning 86.111-01.

Volummessig må kommunene Flekkefjord, Lyngdal og Vennesla betraktes som overskuddskommuner. Åseral, Hægebostad, Kvinesdal, Marnardal, Audnedal, Lindesnes og Sirdal har tilstrekkelig tilgang på sand og grus for å dekke det lokale behov. I Søgne kommune er det ubetydelige mengder sand og grus. De øvrige kommunene har noe, men må likevel betraktes som underskuddskommuner, fig. 2, 3 og vedlegg 2.1. I heiområdene i de indre kommunene Kvinesdal, Sirdal, Åseral og Hægebostad er det en god del rygger (eskere) med sand og grus. Disse ligger ofte langt fra vei og er ikke befart, men registrert fra flybilder og tegnet inn på sand- og grusressurskartene.

SAND- OG GRUSRESERVER I KOMMUNENE

MED ANDEL BEBYGDE VOLUM




Fig. 2

VEST-AGDER FYLKE

SAND- OG GRUSRESSURSER 1986




Fig. 3

De mange steintippene etter kraftverksutbyggingen rundt om i fylket kan være et godt tilskudd, da det i alle kommunene er underskudd av grovt materiale.

Det er registrert 10 pukkverk i fylket hvorav 7 er i drift. Av disse ligger 4 i Kristiansandsområdet. I områder med underskudd på naturgrus er pukk et naturlig erstatningsmateriale. Lokalisering nær forbruksentra gir konkurrsedyktige priser i forhold til import av naturgrus. Tilsvarende gjelder når naturgrusen ikke tilfredsstiller kvalitetskravene til generelle eller spesielle byggetekniske forhold.

Av det totale volum består over 70 % av sand, fig. 4. I tillegg til generelt underskudd på grove masser er grusmaterialet svakt og knuses lett ned selv ved moderate slagbelastninger. Dette gjør det vanskelig å skaffe god grus til vegformål i fylket, fig. 5. Som en konsekvens av dette importeres årlig store mengder pukk fra Rekefjord før bruk til vegformål.

VOLUM FORDELT PÅ AREALBRUK OG KORNSTØRRELSE




Fig. 4

De fleste kommunene er selvforsynt med sand til betong- og støpearbeider med vanlige krav til styrke. I mange forekomster eller deler av disse, er sanden ofte ensgradert og finkornig. Innholdet av mineraler som kan svekke betongens trykkfastheter varierer også. Det er derfor viktig at man ved lokalisering av uttaksområder tar hensyn til disse forhold.

Det må understrekkes at den vurdering av kvalitet som er gjort i Grusregisteret, refererer seg til materialet i naturlig tilstand. Ved foredling og bruk av tilsettingstoffer kan en dårlig naturlig kvalitet forbedres. For å få en nøyaktig oversikt over kvalitet og volum for ulike tekniske formål er det nødvendig med mer detaljerte undersøkelser.

Det er også viktig å være klar over at den anvendelige delen av de beregnede volum ofte kan være betydelig mindre enn totalvolumet som er oppgitt. Foruten de kvalitetsmessige kriterier, kan også arealbruken legge begrensninger på det uttagbare volum. Fig. 4 viser at ca. 20 mill. m³ av det totale volum er båndlagt av bebyggelse og kommunikasjonsarealer. Av de øvrige volum ligger ca. 40 mill. m³ under dyrka mark, vel 20 mill. m³ er bevokst med skog og 4 mill. m³ ligger i eksisterende massetak.



Etter hvert som forekomstene blir grundigere undersøkt og driftsforholdene i massetakene forandrer seg er det viktig at Grusregisteret oppdateres.

For å få en fullstendig oversikt over ressurssituasjonen for sand og grus i fylket, er det nødvendig å lage et ressursregnskap. Da vil man få en oversikt over uttaksmengder, transportveger, bruksområder og forbrukere. Overskudds- og knapphetsområder vil kunne kartlegges, og dermed hvor presset på ressursene er størst. Man får et grunnlag for å utarbeide uttaksplaner og vurdere forsyningsområder for å dekke framtidige behov for sand og grus, eventuelt hvor det er behov for knust fjell for produksjon av pukk.

VEST-AGDER FYLKE

Mekaniske styrkeegenskaper vurdert etter bergarts-tellinger i fraksjon 8-16 mm

TEGNFORKLARING



BERGGRUNNEN

av P. Padget

Berggrunnen i Vest-Agder er sammenstilt på kartbladene Mandal og Sauda i NGUs kartserie i målestokk 1:250 000, samt på berggrunnskart over Norge i målestokk 1:1 mill.

Berggrunnen består hovedsakelig av Agderkompleksets bergarter som er et gneis-migmatittkompleks av prekambrisisk eller Proterozoisk alder. De eldste bergartene som er dannet under den svekokarelske fjellkjededannelsen for omtrent 2 milliarder år siden, består av migmatittiske båndgneiser, granittiske gneiser og øyegneiser, samt mindre mengder andre bergarter.

Bergartenes nåværende krystalline karakter skyldes langvarig oppvarming og omfattende omkrystallisering (metamorfose) i et dypere snitt av jordskorpen. Oppsprekking og folding forekom under flere faser av fjellkjededannelsen.

Etter at disse prosesser begynte å avta for 1000 millioner år siden trengte store magmamasser opp fra dypet og dannet Egersundkomplekset. Den østlige delen av komplekset finnes i den sydvestlige delen av Vest-Agder i Flekkefjord-Lyngdalområdet, hvor det er representert ved anortositt, pyroksen-kvartsmonzonitt og charnockitt. Andre dypbergarter finnes øst og nord for Farsund, bl.a. hornblende- og biotittførende granitter. Disse er sannsynligvis noe yngre men fortsatt av Proterozoisk alder.


Intrusjon av disse dypbergartene førte til en temperaturøkning i de eksisterende gneiser med omkrystallisering og ny mineraldannelse som resultat.

Intrusjons- og metamorfoseprosessen anses som ferdig for ca. 900 millioner år siden, og jordskorpen i denne del av Vest-Agder stabilisert.

Langs kysten fra Mandal til Kristiansand finnes enkelte små doleritt-(diabas) eller lamprofyrganger av permisk alder, fig. 6.

BERGGRUNNEN I VEST-AGDER FYLKE

Forenklet etter berggrunnskart over Norge, M 1:1 mill. NGU 1984



KVARTÆRGEOLOGIEN

Løsmassene i Norge er for det meste dannet i sluttfasen av siste istid og under isavsmeltingen for ca. 10 000 år siden.

Karakteristisk for fylket er en mangel på løsmasser. De løsmassene som finnes er koncentrert til dalgangene. Mellom dalene er løsmassedekket meget sparsomt. Raet, en endemorene dannet for ca. 10 000 år siden, inntar en meget sentral plass i fylkets kvartærgеologi. Denne markerte moreneryggen styrer løsmassefordelingen i dalbunnen.

Raet kommer inn i Vest-Agder ved Verås i Vennesla og fortsetter nesten som en sammenhengende rygg til sørrenden av Sirdalsvatn. Den danner opptil 25 m høye rygger, og flere steder framtrer disse som frittliggende høydepunkter, f.eks. Loland i Vennesla. Noen steder danner Raet parallelle rygger eller et morenebelte. Blokkinnholdet i Raet er de fleste steder meget stort.

Før Raet ble dannet var Listatrinnet og Spangereidtrinnet avsatt. Dette er også morenerygger, men av mindre størrelse og utstrekning. Hele Listatrinnet og deler av Spangereidtrinnet er vasket av havet, og noen steder er det dannet strandvoller, f.eks. ved Tjøm, Underø og Spangereid, foruten på Lista.

Avsetningene i hoveddalene er dominert av breelvavsetninger nær Raet og elveavsetningene ytterst mot kysten. Nær Raet dekker sanduravsetninger hele dalbunnen. Dalbunnen ved Korsmo er et godt eksempel på en sandur. Materialet er grovt med mye stein og grus. Etter få kilometer avtar kornstørrelsen markert, og sandurflata er nederodert og danner terrasser i dalsidene. Elveslettene dominerer da dalbunnen. Ytterst i dalene består terrassene av finsand og silt. Disse er avsatt i havet for 5 000-10 000 år siden. Havet stod da høyere enn i dag. Den marine grense (MG) angir dette nivå. Den er i Kristiansand ca. 28 m o.h. for å synke vestover til 7-8 m o.h. på Lista.

Nord for Raet er dalenes basseng- og trauførmer fylt opp av relativt tynne breelv- og elveavsetninger med liten dybde til grunnvannsspeilet. I Sirdal er det imidlertid utviklet større og mektigere avsetninger.

Noen mindre sidedaler har en drenering mot nord. Selv om dette er over relativt korte avstander, er disse dalene fylt opp med til dels store


mengder finsand og silt. Ved Hægeland i Vennesla er det isen i nord som har dannet en bresjø som dette materialet er avsatt i. Ved Øverbø i Vennesla og Lavstøl vest for Kvinlog har Raet stått for denne oppdemningen.

I de fleste dalene som har en retning øst-vest, er det lagt opp morene i den sørlige dalside, altså på tvers av den retning innlandsisen beveget seg. Dette er kalt støtsidemorene og er vanlig i de fleste øst-vestgående daler. Det er også en tendens til morene på lesidene. Materialet er her mindre og ligger helt nede ved fjellfoten, mens det på støtsida går et stykke opp i dalsida. Blokkinnholdet er stort.


Lista innehar en spesiell stilling i Vest-Agders kvartærgeologi. Mange formtyper og jordarter er her representert. Den kvartære utviklingshistorie er enda ikke fullt ut forstått. Stedet er derfor et viktig forskningsområde. Sammen med Jæren var Lista det første kystområdet som smeltet fram fra innlandsisen for ca. 13 500 år siden. Lista er også det største sammenhengende området med løsmasser i Vest-Agder.

Dagens prosesser i de kvartære avsetninger består av erosjon i de elvenære avsetninger, transport av dette materialet i elvene og avsetning ytterst i elvemunningene. Slike deltaavsetninger i dagens havnivå sees tydelig ved Manndalselvas utløp i Mandal, Audna ved Snig og Lyngdalselva i Lyngdalsfjorden. Dette kan være mulig framtidige sandkilder. Der løsmassene ligger eksponert for havet, vil bølger og vindens aktivitet være med å forme landskapet. Lista er et godt eksempel på dette.

Fig. 7 SANDUR. SITUASJONEN ER KARAKTERISTISK FOR DANNELSEN AV MANGE SAND- OG GRUSFOREKOMSTER I VEST-ÅGDER




- A. Breeelver sprer seg ut over dalbunnen foran isfronten. Disse fører med seg løsmasser og bygger opp en sandur.



- B. Isen har trukket seg tilbake og raet demmer opp en innsjø. Elven har skåret seg ned i avsetningen, og lenger nedover i dalen er det dannet elvesletter.


Karakteristisk er tilnærmet horizontal lagdeling med grovt materiale som stein og blokk nærmest Raet, mens kornstørrelsen avtar gradvis utover i dalen.

Fig. 8: DANNELSE AV ESKER



- A: Sand og grus blir avsatt av en breelv i sprekker eller tuneller i en stagnerende isbre.
- B: Isen er smeltet bort og sand og grus ligger igjen som rygger og hauger i terrenget.

NOEN TYPISKE KORNFORDELINGSKURVER



(1) MORENEMATERIALE (2) ELVEMATERIALE (3) BREELVMATERIALE

Fig. 9: NOEN TYPISKE KORNFORDELINGSKURVER.

JORDARTENES EGNETHET SOM BYGGERÅSTOFF

Breelvavsetninger

Breelvavsetninger er de viktigste sand- og grusressursene i området. De er ofte bygget opp i mektige lag med sand og grus. Større deltaavsetninger har horisontale topplag av grus og stein. Grunnvannsnivået er oftest lavt, og massene er rene og vanligvis fri for skadelig innhold f.eks. av korrosive stoffer eller humus.

Særlig er forekomster knyttet til Raet og avsetninger fra brattere sidedaler attraktive fordi disse ofte har god tilgang på grovere materiale av grus og stein, noe som er nødvendig f.eks. til veg- og betongformål. I særlig grad krever vegbygging bruk av de grovere kornfraksjoner. Nedover i forekomstene kan imidlertid innholdet av mellom- og finsand, til dels også silt være betydelig.

Elveavsetninger

Store arealer i dalførene har elveavsetninger. I daler med slak lengdeprofil (hoveddalførene) består disse oftest av sand. For en stor del vil dette være godt sortert (ensgradert) sand, ofte i størrelsen fin- og mellomsand. Dels også med siltinnhold. Forekomster som er dominert av finsand (middelkornstørrelse $< 0.2 \text{ mm}$) faller utenfor klassifikasjonen som sand-/grusressurs.

Elveavsetninger har vanligvis også lavere mektighet ned til finsedimenter eller grunnvannsnivået enn breelvavsetningene. De vil også ofte være betydelige "forurensset" av organisk materiale (humus) eller jernutfelling.

Strandavsetninger

Strandavsetninger består vanligvis av sand, men lokalt også grovere materiale, slik som i de mange strandvollene på Lista og ved Spangereid. Generelt opptrer strandavsetningene som relativt tynne lag med få meters mektighet over havavsetninger eller morene. Slik avsetningstypen opptrer i Vest-Agder vil de være uegnet til større masseuttak.

Strandavsetningene er ofte ensgradert og kan ha en del utfelling av jern/humus.

Morene

Morenemateriale består av alle kornstørrelser fra blokk til leir og blir vanligvis ikke regnet som sand- og grusressurs. Sporadisk brukes imidlertid en del morenemateriale, f.eks. til bygging av skogsbilveier. Grusrik morene kan også være egnet til andre byggetekniske formål etter bearbeiding/foredling, evt. også blandet med annet materiale.

(NB! Det som folk flest karakteriserer som morene, f.eks. massene i et grustak, er etter de definisjoner som her blir brukt, breelvavsetninger).

DANNELSE AV SAND OG GRUS

Sand- og grusressurser er løsmasser som fra naturens side er sortert og anriket i sand- og grusfraksjonen (sand: 0.063 - 2 mm, grus: 2 - 64 mm). De viktigste sand- og grusressursene i fylket er dannet som breelvavsetninger (glasifluviale avsetninger) under isavsmeltingen. Viktige naturgitte forhold som har bestemt forekomstenes beliggenhet, volum og kvalitet har vært:

- Isfrontens beliggenhet

Isfronten hadde et markert opphold i tilbaketrekningen for ca. 10 000 år siden. Da ble den store endemorena Raet dannet. Materialet ble også spyttet ut i dalene sør for Raet og fylte hele dalbunnen. Dette er de såkalte sanduravsetningene som er de viktigste gruskildene i fylket, fig. 7. De to andre endemorenene Listatrinnet og Spangereidtrinnet, har ikke dannet tilsvarende store grusforekomster.

- Havets og sjøens nivå

Noen av de større sand- og grusforekomstene i de østlige deler av fylket ligger i nivå med havets største utbredelse, den marine grense (MG). I dette nivået ble materialet avsatt som et delta under vann. Da landet hevet seg etter istida ble disse forekomstene tørrlagt. Tilsvarende forhold gjelder ved avsetning i innsjøer. Slike eksempler finnes i Sirdal og Åseral.

- Agnordaler

Dette er daler som har en drenering mot N, NV eller NØ. Det vanlige i Vest-Agder er mot S. Da innlandsisen smeltet tilbake mot N dannet det seg sjøer i disse dalene støttet opp av isen. I disse sjøene ble det avsatt materiale, mest sand. Flere av de kartlagte sandforekomstene i registeret er dannet på denne måten.

I alle disse typer avsetninger har ofte elvene under den senere landheving skåret seg ned og avsatt materialet lenger ut langs vassdragene, som elveavsetninger. Langs vassdragene sees ofte ulike terrassenivåer og erosjonskanter som forteller om disse prosessene. De øverste terrassene representerer da gjerne breelvavsetningene.

Breelvmateriale ble også enkelte steder avsatt i smeltevannstuneller under isen. Når isen senere smeltet lå det tilbake rygger og hauger av grus og sand (eskere), opptil 15-20 m høye over terrenget omkring. Se fig. 8.

SAND- OG GRUSKVALITETER

Sand er pr. definisjon materiale mellom 0.063-2.0 mm. For byggetekniske formål er den fineste aksepterte kornstørrelsen 0.2. Avsetninger med finere middelskornstørrelse enn dette har i dag liten praktisk interesse annet enn til fyllmasse. Disse er derfor i den grad det har vært mulig, ikke tatt med i registeret.

I denne rapporten er alle kvalitetsbetrakninger vurdert på grunnlag av visuelle metoder ut fra krav til vei- og betongformål.

I mange av forekomstene er sand den dominerende kornstørrelse. Ofte finnes grus bare i topplaget og med begrensede mektigheter. Dette begrenser også anvendbarheten av forekomstene til veiformål, hvor det er ønskelig med grov grus og stein som kan knuses ned til ønskede kornstørrelser. Knuste masser gir bedre stabilitet i bærelag og forsterkningslag enn naturgrus, og blir derfor foretrukket selv om rundet naturgrus ofte er noe sterkere.

Hovedkriteriene er kornstørrelse, styrken på grusmaterialet mot slag og abrasjon, samt innholdet av glimmer og andre ueheldige stoffer i sanden. Utgangspunktet for vurderingen er dessuten dagens teknologi og økonomiske situasjon.

Berggrunnen i Vest-Agder består hovedsakelig av gneis i ulike varianter, og en del granitt, fig. 6. Ofte gir disse bergartene grusmateriale av tilfredsstillende kvalitet til de fleste veiformål (høy ripemotstand og god motstandsdyktighet mot nedknusing).

I Vest-Agder viser undersøkelser at naturlig sortert grus har høy ripemotstand, men mindre god mekanisk styrke som gjør at den lett lar seg knuse ned selv ved moderate påkjenninger. En har derfor problemer med å bruke grus fra de fleste forekomstene i fylket som tilslag til faste veidekkere (asfalt). Til forsterkningslag i veier med moderat trafikkbelastning kan massene derimot benyttes.

For betongformål er flere forhold av betydning, men spesielt kornstørrelse og mineralinnhold bør bemerknes. For å få en tett betong er det viktig at sanden har en jevn fordeling av alle kornstørrelser slik at det ikke oppstår luftporer og dermed svekkelse av betongkvaliteten. Mange av forekomstene har overskudd av sand, og ofte er denne ensgradert med en steil siktekurve. Denne er derfor først etter bearbeiding gjennom siktning,

blanding med andre masser osv. egnet til betongformål med høye kvalitetskrav.

Innholdet av glimmer og skiferkorn i sanden har betydning for betongens vannbehov. Høyt innhold av slike mineraler øker betongens vannbehov og dermed øker også cementbehovet dersom bearbeidbarheten og styrken av betongen skal ivaretas. De forekomstene i fylket som er undersøkt med henblikk på dette, har et innhold på 2-8 % av disse mineralene. Dette er så lavt at det ikke synes å ha noen negativ innvirkning på sandens egenskaper til betongformål.

På grunn av mulige variasjoner både i mineralsammensetning og kornstørrelse ikke bare regionalt, men også helt lokalt, er det nødvendig med detaljerte kvalitetsundersøkelser før masser blir tatt ut og brukt til større byggearbeider både til vei- og betongformål.

ULIKE AREALBRUKSINTERESSER

Et særtrekk ved sand- og grusforekomstene er at de ofte er lokalisert i områder med stor kompleksitet når det gjelder arealbruk. Dette gir ofte konkrete konflikter om arealutnyttelsen.

Til de fleste sand-/grusforekomster som er aktuelle for uttak vil det også være knyttet andre arealbruksinteresser, f.eks.

- grunnvannsforsyning
- avfallsdeponering
- infiltrasjon av avløpsvann
- boligbygging
- industriområder
- veganlegg, jernbane, flyplasser
- jord-/skogbruk - dyrkingsjord
- vern av fortidsminner
- vern av klimaregulerende terrengformasjoner
- vern av naturvitenskapelige verdifulle forekomster
- landskapsvern, friluftsliv og rekreasjon.

I mange tilfeller vil en type arealbruk utelukke eller blokkere for annen arealbruk.

I Grusregisteret finner man opplysninger om forekomstens betydning som råstoffkilde, noe som kan være til hjelp når man i planleggingssammenheng skal vurdere utnyttelsen av arealer.




Fig. 10: Sand- og grusressurser - arealbruk

Eksempel på ulik arealbruk i et dalføre dominert av breelv- og elveavsetninger.

FORVALTNING AV SAND OG GRUS

Med et årlig forbruk på 20 mill. m³ i Norge, representerer sand- og grusressursene store nasjonale verdier. Med en gjennomsnittspris på 55 kr pr. m³ gir dette en verdi på en milliard kroner, som er større enn brutto produksjonsverdien av alle andre mineralske råstoffer produsert på land i Norge i dag. Jern har til sammenligning en verdi på 650 mill. kr. (NOU 1984:8).

Flere offentlige utredninger i de siste år har tatt for seg problemene omkring forvaltningen og utnyttingen av våre sand- og grusressurser. Særlig gjelder dette NOU 1980:18 om Sand og grus, men også NOU 1982:24 Industrimineraler, NOU 1983:46 Norsk Kartplan 2 og NOU 1984:8 Utnyttelse og forvaltning av mineralressurser.

Sand og grus må betraktes som en ikke-fornybar ressurs, selv om det i geologisk perspektiv stadig dannes nytt materiale. De geologiske betingelsene for dannelsen av sand og grus gjør at forekomstene er geografisk ujevnt fordelt. I mange kommuner er det derfor liten tilgang på sand og grus og behovet må dekkes ved import andre steder fra. Dette fører til lange transporter og fordyring av massene.

Det er et klart behov for å få en bedre planlegging av utnyttelsen av sand- og grusressursene. Dette har flere årsaker:

- Oversikten over reserver, forbruk og materialstrøm er mangelfull.
- Distriktsvis knapphet, generelt eller på enkelte kvaliteter.
- Arealkonflikter. Sand- og grusforekomstene er som nevnt godt egnet til flere ulike typer arealbruk, og dette gir lett konflikter mellom motstridende interesser for utnyttelse av grunnen.
- Miljøproblemer. Direkte ulemper for omgivelsene i form av støy, støv- og sandflukt, økt trafikkbelastning, fare for ulykker, skjemming av landskap/nærmiljø.

Utkast til ny minerallov (NOU 1984:8) foreslår at det innføres en drifts- og ervervkonsesjon på uttak av løsmasser. På denne måten kan myndighetene (Bergmester) sette vilkår for driften, bl.a. at det skal utarbeides driftsplanner og forekomsten sikres. Hvilke andre vilkår som skal stilles vil bero på forvaltningsmyndighetens skjønn. På denne bakgrunn skulle det

for de lokale myndigheter være mulig å løse miljø- og arealkonfliktene gjennom virkemidlene som en reguleringsplan og en driftsplan til sammen gir. Miljø- og arealkonflikter er problemer som må løses på det lokale plan ved tilpassing i hvert enkelt tilfelle.

Utnyttingen av sand og grus som en ikke-fornybar naturressurs er derimot en samfunnsoppgave som de sentrale og fylkeskommunale myndigheter har ansvar for. Prinsippet for en ressursforvaltning på nasjonalt og fylkeskommunalt hold kan bygge på tre hovedelementer:

- ressurskartlegging
- ressursregnskap
- ressursbudsjett

En kartlegging gir kunnskap om ressursenes størrelse og lokalisering. Dette er det av vital betydning å kjenne, også for å kunne planlegge arealbruken. Nedbygging av en grusforekomst vil kunne stenge for uttak av masser i uoverskuelig tid framover. Et ressursregnskap gir løpende informasjon om tilgang og bruk av ressursene, mens et budsjett vil bygge på framskrivinger av regnskapet under visse forutsetninger.

Det foreliggende Grusregisteret er å betrakte som det første ledet, ressurskartleggingen, i den skisserte ressursforvaltningen ovenfor. Grusregisteret gir oversikt over lokalisering, mengde, arealbruk, kvalitet m.m. for de forekomster som er registrert i fylket. Det er meningen at Grusregisteret ikke bare skal kunne nytes til å finne byggeråstoff i fylket, men også være til nytte i den øvrige fysiske planlegging av arealer i tilknytning til sand- og grusforekomstene.

GRUSREGISTERET

Organisering

Initiativet til å få utviklet og etablert Grusregisteret kom fra Miljøverndepartementet. Metodeopplegg for denne type undersøkelser ble utarbeidet for Miljøverndepartementet ved fylkeskartkontorene i Telemark og Vestfold i samarbeid med NGU. (Jfr. Miljøverndepartementets rapp. T 521). I dag utføres registreringsarbeidet av NGU (jfr. NGU-rapport nr. 86.126).

Registeret er hittil etablert i følgende fylker: Telemark, Vestfold, Sogn og Fjordane, Oppland, Buskerud, Møre og Romsdal, Sør-Hedmark, Aust-Agder og Vest-Agder. Feltarbeidet pågår i Østfold, Akershus, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Finnmark. Hele landet ventes ferdig registrert i 1991.

Registeret er EDB-basert for enkelt å kunne oppdateres med nye opplysninger, og kunne kobles til andre typer data.

Driften av registeret med dataformidling overfor brukere blir lagt til det enkelte fylkeskartkontor, som vil ha oversikten over sitt fylke, mens NGU skal ha landsoversikten.

Innholdet i registeret

Grusregisteret lagrer og systematiserer data om forekomster av sand/grus og andre masser egnet til byggeråstoff. Registeret er først og fremst etablert for å gi en oversikt over ressurssituasjonen. Det inneholder en rekke opplysninger om den enkelte forekomst, men opplysningene er ikke omfattende nok for detaljert driftsplanlegging av større massetak.

Registeret omfatter fire materialtyper:

Sand/grus: Sorterte løsmasser anriket på sand og/eller grus, med lavt finstoffinnhold. Massene trenger vanligvis liten eller ingen foredling før å brukes til byggeråstoff.

Andre masser: Andre løsmasser, f.eks. skredmasser og morene. Disse krever vanligvis mer foredling hvis de skal nytties til annet enn fyllmasser.

Pukk: Masser som teknisk er knust ned fra fast fjell til ønskede kornstørrelser.

Skrotstein: Sprengt fjell som ikke er foredlet, f.eks. steintipper. Skrotstein kan være aktuelt som fyllmasse eller som råstoff for pukkverk.

Opplysningene som forekomstene viser:

- Betydning som råstoffkilde:

areal og volum, kvalitet, nåværende masseuttak

- Andre bruksinteresser knyttet til ressursene:
nåværende arealbruk på forekomsten, muligheter for grunnvannsuttak, verneverdi, andre konflikter ved uttak av masse
- Andre opplysninger:
eiendomsinndeling innen forekomsten, referanser til tidligere undersøkelser av forekomsten.

Registeret gir dermed grunnlag for en helhetsvurdering av interesser knyttet til forekomsten.

Forekomster med volum mindre enn ca. 50 000 m³ og mektighet mindre enn ca. 2 m over grunnvannsnivå er vanligvis ikke registrert med eget forekomstnummer og registreringsskjema. I områder med lite sand/grus er det imidlertid tatt med flere små forekomster enn i områder med rikelig sand-/grusressurser. Detaljeringsgraden av registreringene varierer altså noe i ulike deler av fylket. Tidsforbruket ved feltarbeidet er vurdert i forhold til betydningen av opplysningene.

Det er lagt opp til tre nivåer for feltregistreringene, avhengig av den enkelte forekomstens betydning som råstoffkilde (kvalitet, størrelse) og den distriktsvise knapphet:

- arealet av en forekomst avgrenses, og volumet beregnes
- arealet av en forekomst avgrenses, men volumet beregnes ikke (stiplet omriss)
- forekomsten punktlokaliseres.

Registreringen av "andre masser" er ikke gjort systematisk. I de fleste tilfellene er disse forekomstene små og vanskelig avgrensbare.

Datainnsamling

NGU foretok en spørreundersøkelse blant alle kommunene i Vest-Agder for å skaffe bakgrunnsmateriale for feltarbeidet. Det ble spurt om lokalisering av forekomster og produksjonsdata. Kommunene skulle også vurdere om de hadde tilstrekkelig tilgang på sand, grus og knuste steinmaterialer.


Statens Vegvesen i Vest-Agder stilte sitt arkiv over analyser og data fra undersøkte forekomster til disposisjon. Kart og litteratur fra NGU og andre institusjoner er også benyttet som grunnlagsmateriale (se litteraturliste). Viktigst er imidlertid flyfoto. Hele fylket er gjennomgått og

tolket på flyfoto i stereomontasje. De fleste forekomster er oppdaget på denne måten.

Feltarbeidet startet sommeren 1985, og det ble avsluttet i løpet av høsten 1986. Forekomstene er avgrenset på økonomisk kartverk i M 1:10 000 og dels 1:20 000. Fra massetak eller åpne snitt er det tatt prøver for bergarts- og mineralanalyse. Kornstørrelsesfordeling, lagdeling og mektighet av forekomsten er vurdert. Produksjonsforhold i massetak og arealbruksfordeling er registrert.

Arealbruksfordelingen omfatter seks typer arealbruk, skog, dyrka mark, bebygd areal, åpen fastmark og massetak. Alle forekomster som er arealberegnet er arealmessig fordelt på en eller flere av disse kategoriene.

I massetakene er det tatt polaroidbilde som viser snitt, mektighet, prøvelokalisering og evt. massetakets størrelse. Bildet følger registrerings-skjemær og feltkart i det manuelle registeret.




SKJEMATISK OVERSIKT OVER GANGEN I
DATAINNSAMLINGEN

Opplysninger utover "minsteregistreringen" er tatt med hvis forekomsten har stor betydning eller informasjonen er lett tilgjengelig. Data om eienomsforhold er registrert hvis det går fram av økonomisk kartverk. Registrert kan videre suppleres/ajourføres på et senere stadium av fylkeskartkontoret eller NGU. Supplering gjelder opplysninger om eier/bruker, produksjon, foredling, anvendelse, transport, priser og arealbruk etter endt masseuttak.

Det er generelt viktig at registeret oppdateres etter hvert som forekomstene blir grundigere undersøkt og driftsforholdene i massetakene forandrer seg.

Undersøkelsene baserer seg på enkle og raske vurderinger i felt uten hjelp av tekniske hjelpemidler for vurdering av bl.a. forekomstenes mektighet. Volumanslagene presenteres derfor som sannsynlighetsverdier.

VOLUMANNSLAG FOR SAND-OG GRUSFOREKOMST



50% - VERDIEN (SANSYNLIG MENDE)
BLIR BEREGNET UT FRA DET MEST
SANSYNLIGE FALLET PÅ FJELLET

90% - VERDIEN (MINIMUMSOVERSLAG)
BLIR BEREGNET UT FRA AT
FJELLOVERFLAETEN HAR MINDRE FALL
ENN TERRENGET INDIKERER, OG AT DET
ER OPPSTIKKENDE FJELLPARTIER UNDER
FOREKOMSTEN

10% - VERDIEN (MAKSIMUMSOVERSLAG)
BLIR BEREGNET UT FRA AT FJELLET
HAR STØRRE FALL UNDER FOREKOMSTEN
ENN TERRENGET RUNDT INDIKERER

Databearbeidelse

Alle feltregistreringer er foretatt på forekomstskjema og massetaksskjema som ligger i det manuelle registeret. For hver avgrenset forekomst er det gjort volumoverslag ut fra beregnet areal og anslått gjennomsnittlig mektighet, fig. 9. Resultatet av bergarts- og mineraltellingene er ført inn i massetaksskjema. Etter hvert er data fra det manuelle registeret overført til EDB og lagret i en database.

Omrisset av forekomstene er digitalisert fra feltkartene og overført til databasen. Siden omrisset ligger lagret som koordinater kan det tas ut i varierende målestokker. Kombinert med opplysninger i det EDB-baserte registeret kan forskjellige typer kart tegnes ut ved hjelp av programstyrte plottere. Opplysningene er lagret kommunevis. Hver forekomst har et nummer innenfor kommunen. Kommune- og forekomstnummer identifiserer en forekomst.

BRUK AV GRUSREGISTERET

Inngangsnøkler og presentasjon

Fylkeskartkontorene og NGU har fått konsesjon fra Datatilsynet til å opprette Grusregister. Opplysningene i registeret er, i følge konsesjonen, tilgjengelig for alle som har et "berettiget" behov for dem.


Fylkeskartkontoret og NGU vil formidle opplysninger fra registeret innen fylket. NGU vil få et landsomfattende Grusregister og vil formidle oversikter på landsdels- og landsnivå.

Fylkeskartkontoret distribuerer grusressurskart i målestokk 1:50 000 (M711) og i liten målestokk som dekker hele fylket (1:250 000). Kartene kan brukes som inngangsnøkkelen til registeret. Hvis man er interessert i opplysninger om grusressursene innen et bestemt område, viser kartet om det finnes forekomster. De gir også opplysninger om størrelse, kvalitet, analyser og arealbruk. Mer detaljerte opplysninger kan en så finne i Grusregisteret. Kartene tegnes ut i svart/hvitt med en datastyrt plotter på topografisk kartgrunnlag, vedlegg 3.

Fra Grusregisteret kan en få flere typer utskrifter. Det kan foreløpig tas ut kopier av alle registrerte forekomstskjema. Det er laget standardiserte tabeller for å kunne kombinere ulike datatyper fra flere forekomster. Tabellene systematiserer data fra forekomster innenfor et geografisk avgrenset område, f.eks. kartblad, kommune eller en vilkårlig avgrensning med oppgitt hjørnekoordinater. Eksempler på forekomstskjema, massetaksskjema og tabeller er vist i vedlegg 1 og 2.

Del-rapportene (kommune-rapportene) gir en oversikt over registreringene i hver enkelt kommune. De inneholder også vurderinger om hvilke forekomster som er mest viktige som grusressurser, hvilke som bør undersøkes mer detaljert osv.

EDB TIL LAGRING OG BRUK AV SAND-OG GRUSDATA



Opplysninger fra Grusregisteret

| Produkt/tjeneste | Fylkes- kartkontoret | NGU | Merknader |
|--|-------------------------|-----|-----------------|
| - Kommunerapporter | x | x | |
| - Fylkesrapport | x | x | |
| - Oversiktskart 1:250 000 | x | x | |
| - Grusressurskart 1:50 000 1) | x | x | |
| - Registreringsskjema med fullstendige opplysninger om forekomstene | | x | |
| - Oversikter i standard tabeller | x | x | |
| - Manuelt arkiv (feltkart 1:5 000/1:10 000/1:20 000, registreringsskjema, evt. rapporter og andre opplysninger om forekomstene | x | | bare til gj.syn |
| - Samtale med geolog vedr. spesielle forekomster, videre undersøkelser etc. | x 2) | x | |
| 1) Dersom feltgrunnlaget er økonomisk kartverk kan grusressurskartene også framstilles i større målestokker, f.eks. 1:20 000. | | | |
| 2) Gjelder i fylker med ansatt geolog. | | | |

1026

**ÅSERAL
KOMMUNE**

Konklusjon:

KOMMUNEN ER GODT FORSYNT MED MASSER TIL LOKALT BRUK

På bakgrunn av det kartlagte volum og det totale forbruk i kommunen, vil Åseral være meget godt forsynt med sand og grus i lang tid framover.

Forekomstene ligger godt spredt rundt i kommunen og har en gunstig kornstørrelse med relativ lite finsandinnhold. Noen forekomster har imidlertid en arealbruk som er lite forenlig med masseuttak. Innholdet av bergarter sterke mot slagpåkjenninger, er generelt lite.

Antall, volum og beliggenhet:

FOREKOMSTENE ER GODT FORDELT PÅ DE ULIKE DELENE AV KOMMUNEN

Det er ialt kartlagt 28 forekomster i Åseral, derav en steintipp. Av sand- og grusforekomstene er 17 areal- og volumberegnet. Det totale volum på disse er 7,3 mill. m³.

De største er 7 Åsland, 9 Toddemonen og 13 Smeland, alle på over 1 mill. m³. Alle disse ligger på strekningen fra nordenden av Øre og opp til Smeland i Austerdalen. Dette er det grusrikeste strøket i hele kommunen. De fleste av disse forekomstene er opprindelig avsatt som en mer eller mindre sammenhengende avsetning i et høyere sjønivå, ca. 10 m over dagens Øre.

De fleste beboede sidedaler i kommunen har sand- og grusforekomster (Ljosland, Borteli, Fiskardalen, Engså), eventuelt mindre og vanskelig avgrensbare avsetninger, markert med bokstav på kartet. I fjellområdet er det flere steder kartlagt grusrygger (eskere). Dette er også markert med eget tegn. De fleste stedene har derfor lett tilgang på masser. Det skal nevnes at en del forekomster er preget av lite nivå over grunnvannsspeilet, f.eks 3 Kylland, 4 Håvarstad, 5 Fiskland, 21 Sinoremonen, 23 Fiskårdalen og 26 Engså. Bare deler av disse er egnet for uttak.

Kvalitet:

FOREKOMSTENE HAR EN GUNSTIG KORNSTØRRELSE

Sammenliknet med de fleste andre kommunene i Vest-Agder, er sandinnholdet i forekomstene i Åseral markert mindre. Det betyr et større grusinnhold, vanligvis 10-35 %. Stein- og blokkinnholdet ligger også noe over gjennomsnittet. I noen mindre forekomster er det svært høyt. I de største forekomstene dominerer imidlertid sanden med et innhold på 70-90 %. Dette gjelder også de forekomstene som ikke er åpnet for masseuttak. Finsand- og siltinnholdet synes å være relativt lite og langt under det som ellers er vanlig i fylket. Mange forekomster har på denne måten en gunstig kornstørrelse til mange vanlige bruksområder.

Grusmaterialet i fraksjonen 8-16 mm domineres av bergartene granittisk gneis, biotittrik gneis, øyegneis og hornblendegranitt. I Agderfylkene gir disse bergartene et sprøtt materiale som er mindre godt egnet til bruk i toppdekke i veg eller andre steder der det stilles store krav til materialstyrken.

I sandfraksjonene 0,5-1 mm og 0,125-0,250 mm er det ikke observert mengder av fritt glimmer eller andre mineraler som kan ha uheldige innvirkninger på betong.

Bruksområder og videre undersøkelse:

DE FLESTE BRUKSOMRÅDER DEKKES

Med dagens forbruk vil Åseral i lang tid framover være godt forsynt med sand og grus. Det er i alle deler av kommunen tatt ut masser fra de kartlagte forekomstene. Det synes derfor ikke umiddelbart behov for å åpne nye forekomster. En del forekomster er idag helt uaktuelle for uttak. Det gjelder bl.a 5 Fiskeland, 6 Kvesmoen, 7 Åslund og 8 Berg. På disse forekomstene opptar bebyggelse og dyrka mark 95-100 % av arealet.

Flere av forekomstene fra og med 9 Toddemonen og til og med 15 Toddeneset synes å ha en gunstig kornstørrelse og sentral lokalisering for mange bruksformål og -områder. Dette gjelder også 17 Røyddansmotippen som er et aktuelt alternativ der det er bruk for knust fjell. Det er derfor ikke noe stort behov for å lete etter fjellforekomster egnet til pukkproduksjon.

Dersom kravene til styrke er store må dette undersøkes nærmere, da denne ofte er dårlig. Det gjelder hele kommunen og alle forekomstene.

GRUSREGISTERET - TABELL 2.1
KOMMUNEOVERSIKT - FOREKOMSTER
m/KARTBLADNAVN (M711)

Søkekriterier
KOM 1026 ÅSERAL

Utskriftsdato : 8. 1.87

| FOREKOMST | KARTBLAD- | MATR.!SANS.! VOLUM! AREAL! AREALBRUK I % |
|-----------|-----------|---|
| NR.!NAVN | !NAVN | !TYPE !MEKT.!1000M3!1000M2! M ! B ! D ! S ! A |

ÅSERAL

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|----------|----|------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 VASSBOTN | Åseral | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 GEITSKARET | Åseral | S | 3 | 229 | 76 | 15 | 0 | 0 | 85 | 0 |
| 3 KYLLAND | Åseral | S | 3 | 529 | 176 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 4 HAVARSTAD | Åseral | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 FISKLAND | Åseral | S | 2 | 117 | 58 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 |
| 6 KVESMOEN | Åseral | S | 2 | 80 | 40 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 |
| 7 ÅSLAND | Åseral | S | 3 | 1328 | 442 | 0 | 15 | 80 | 5 | 0 |
| 8 BERG | Åseral | S | 2 | 231 | 115 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 |
| 9 TODDEMONEN | Åseral | S | 5 | 1283 | 256 | 2 | 13 | 50 | 35 | 0 |
| 10 ROMONEN | Åseral | S | 4 | 186 | 46 | 5 | 0 | 0 | 95 | 0 |
| 11 JONESET | Åseral | S | 3 | 89 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 12 TORSLAND | Åseral | S | 2 | 794 | 397 | 0 | 10 | 50 | 40 | 0 |
| 13 SMELAND | Åseral | S | 5 | 1275 | 255 | 5 | 10 | 55 | 30 | 0 |
| 14 EIKEMOEN | Åseral | S | 4 | 120 | 30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 15 TODDENESET | Åseral | S | 3 | 234 | 78 | 5 | 20 | 0 | 75 | 0 |
| 16 HODNA | Åseral | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 RØYDDANSMOTIPPEN | Åseral | A | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 RØYDDANSMOEN | Åseral | S | 2 | 212 | 106 | 0 | 10 | 0 | 90 | 0 |
| 19 AKNES | Austad | S | 2 | 127 | 63 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 |
| 20 BORTELI | Austad | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 SINOREMONEN | Åseral | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 HAVESTØL | Åseral | S | 10 | 391 | 39 | 0 | 80 | 10 | 10 | 0 |
| 23 FISKÅRDALEN | Åseral | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 TJØNNÆ | Åseral | S | 2 | 119 | 59 | 5 | 5 | 40 | 50 | 0 |
| 25 VEDHØMMEN | Åseral | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ENGSA | Åseral | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 TROGETJØNNMONEN | Åseral | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 ESKERE | Kvifjorden | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM 28 | | 3 | | | 7350 | 2319 | 2 | 13 | 50 | 35 |

TABELLFORKLARING

KARTBLADNAVN = Navn på sand- og grusressurskartet i målestokk
1 : 50000.

MATR.TYPE = Materialtype; S = sand og grus, P = pukk, A = andre materialer.

SANNS. MEKT. = Anslag for den mest sannsynlige mektighet i meter.

VOLUM = Anslått volum i hele 1000m³ basert på den midlere (50% sannsynlige) mektighet og ressursarealet (totalarealet evt. fratrukket massetaksarealet).

AREAL = Totalareal i hele 1000m² (fratrukket et evt. massetaksareal).

AREALBRUK I % = Anslått arealbruksfordeling i % av totalarealet;
M = Massetak, B = bebyggelse og kommunikasjon, D = dyrka mark,
S = Skog, A = annet.

SUM = Antall forekomster, antall ulike kartblad, volum, areal og
gjennomsnittsverdien for arealbruk.

GRUSREGISTERET - TABELL 3
KOMMUNEOVERSIKT - MASSETAK

Søkekriterier
KOM 1026 ÅSERAL

Utskriftsdato : 8. 1.87

| FOREKOMST NR. NAVN | !MASSETAK! DRIFT! KORNSTØRRELSE! FOREDL.! KONFLIKT !ETTER- ! NR. ! !B1! St! G! S! !PROD. ! ! BEH. | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|

ÅSERAL

| | | | | | | | |
|---------------------|----|---|----|----|----|----|---|
| 1 VASSBOTN | 1 | S | 25 | 25 | 50 | | |
| 2 GEITSKARET | 1 | N | 15 | 25 | 30 | 30 | |
| 3 KYLLAND | 1 | S | 15 | 35 | 50 | | |
| 10 ROMONEN | 1 | D | | 10 | 90 | | |
| 10 | 2 | S | 10 | 10 | 80 | | |
| 13 SMELAND | 1 | S | 5 | 10 | 85 | J | |
| 15 TODDENESET | 1 | N | 2 | 13 | 25 | 60 | V |
| 16 HODNA | 1 | N | 5 | 20 | 30 | 45 | U |
| 17 RØYDDANSMOTIPPEN | 1 | S | | | | KS | |
| 20 BORTELI | 1 | I | 5 | 10 | 35 | 50 | |
| 21 SINOREMONEN | 1 | I | 15 | 35 | 50 | | |
| 22 HAVESTØL | 1 | S | | 10 | 90 | | |
| 23 FISKÅRDALEN | 1 | N | 5 | 20 | 75 | | |
| 24 TJØNNÆ | 1 | | 10 | 35 | 55 | | |
| 25 VEDHØMMEN | 1 | I | 5 | 20 | 40 | 35 | |
| 26 ENGSÅ | 1 | I | 10 | 30 | 60 | | |
| 27 TROGETJØNNMONEN | 1 | S | 5 | 20 | 75 | | |
| SUM 28 | 17 | | 1 | 8 | 18 | 73 | |

TABELLFORKLARING

DRIFT = Driftsforhold : D = drift, I = ikke drift,
S = sporadisk drift, N = nedlagt.

KORNSTØRRELSE = Visuell vurdering av kornstørrelsесfordelingen i et typisk snitt. Bl = prosentandel blokk ($d > 256\text{mm}$), St = prosentandel stein ($256\text{mm} > d > 64\text{mm}$), G = prosentandel grus ($64\text{mm} > d > 2\text{mm}$), S = prosentandel sand, silt og leir ($d < 2\text{mm}$).

FOREDLING/PRODUKSJON: S = sikting, V = vasking, K = knusing,
A = asfaltverk/oljegrusproduksjon,
B = betong/betongvareproduksjon, X = annet.

KONFLIKT = konfliktsituasjoner :

B = bebyggelse, I = industri, U = institusjon O = militært område, V = veg, T = jernbane, P = flyplass, L = kraftlinje, J = jordbruk, Y = mulig nydyrkingsområde S = skogbruk, E = eksisterende grunnvannsuttak, R = resipient, G = mulig fremtidig grunnvannsuttak, F = fredet areal, A = vernet areal, N = fornminner, D = mulig verneverdi, M = miljøulemper, K = klimaendring, H = forurensning av vassdrag, X = andre.

ETTERBEHANDLING : U = utført, D = delvis utført, P = planlagt, T = utelatt.

SUM = antall forekomster, antall massetak og prosentfordeling av kornstørrelse beregnet etter volum.

GRUSREGISTERET - TABELL 4
KOMMUNEOVERSIKT - ANALYSER

Søkekriterier
KOM 1026 ÅSERAL

Utskriftsdato : 4.12.86

| FOREKOMST NR. NAVN | ! MASSE- ! BERGARTSINNH. ! MINERALINNHOLD ! SPRØH.&FLIS. |
|-----------------------|--|
| | ! TAK NR. ! AA BB CC NN ! G A B M A! S F |
| | -----! |

ÅSERAL

| | |
|------------|------------------------|
| 1 VASSBOTN | 1 1 49 45 5 99 3 12 85 |
| 3 KYLLAND | 1 4 38 56 2 99 17 83 |
| 10 ROMONEN | 1 54 45 1 99 1 7 92 |
| 13 SMELAND | 1 4 41 55 99 1 7 92 |

| | | |
|-----|----|----|
| SUM | 28 | 17 |
|-----|----|----|

TABELLFORKLARING

BERGARTSINNH.% = Visuelt anslag for bergartkornenes styrke (8-16mm)

AA = Prosentandel av 'meget sterke korn', BB = Prosentandel av 'sterke korn', CC = Prosentandel av 'svake korn', NN = Prosentandel av 'meget svake korn'. En del analyser er utført uten skiller mellom gruppe AA og BB.

MINERALINNH.% = Visuell bedømmelse av mineralinnhold i sandfraksjonen

Fraksjon 0.5-1.0mm:

G = Glimmer (frikorn), A = Andre korn (vesentlig bergartsfragmenter samt frikorn av kvarts feltspat).

Fraksjon 0.125-0.250mm:

B = Glimmer (frikorn) og skiferkorn, M = 'Mørke' mineraler (amfibol, pyrokse, epidot og granat), A = Andre korn (vesentlig kvarts og feltspat).

SPRØH. & FLIS = Sprøhets- og flisighetstallet.

Her føres resultatet fra analyser i fraksjonen 8-11.2 mm med 50% laboratoriepukket materiale.

SUM = Antall forekomster og massetak.

LITTERATUR

Andersen, B. G. - 1960: Sørlandet i sen- og postglasial tid.
NGU NR. 210.

Falkum, T. - 1982: Mandal. Berggrunnsgeologisk kart 1:250 000.
Nor. geol. unders.

Hansen, H. J. og Wolden, K. - 1986: Ressursregnskap for sand, grus og pukk
i Aust-Agder fylke 1985. NGU-rapport nr. 86.163.

Holmsen, G. - 1965: Nyttbare sand- og grusforekomster i Syd-Norge. Del 1.
NGU NR. 233.

Holmsen, G. - 1971: Nyttbare sand- og grusforekomster i Syd-Norge. Del 2.
NGU NR. 271.

Holmsen, G. - 1979: Grunnlag i kvartærgeologi. NGU NR. 347.

Holtedal, O. (ed.) - 1960: Geology of Norway. NGU NR. 208.

Huseby, S. - 1978: Austad. Beskrivelse til vannressurskart 1512-I,
1:50 000. Nor. geol. unders.

Huseby, S. - 1979: Hægebostad. Beskrivelse til vannressurskart 1411-IV,
1:50 000. Nor. geol. unders.

Huseby, S. - 1982: Mandal m/Ryringen. Beskrivelse til vannressurskart
1411-II, 1:50 000. Nor. geol. unders.

Huseby, S. - 1982: Lyngdal m/Lindesnes. Beskrivelse til vannressurskart
1411-III, 1:50 000. Nor. geol. unders.

Neeb. P.-R. - 1986: NGUs etablering av et EDB-basert Grus- og
Pukkregister. Fjellsprengningsteknikk, bergmekanikk og geotek-
nikk. Tapir 1986.

Miljøverndepartementet, Ressursavdelingen - 1981: Grusregisteret. Del 1.
RAP. T - 521.

NOU 1980:18; Sand og grus. Univ. forlaget.

NOU 1984:8 ; Utnyttelse og forvaltning av mineralressurser. Univ. forlaget.

Padget, P. - 1984: Arendal. Berggrunnsgeologisk kart 1:250 000.
Foreløpig utgave. Nor. geol. unders.

Sigmond, E. M. - 1975: Sauda. Berggrunnsgeologisk kart 1:250 000.
Nor. geol. unders.


Sigmond, E. M., Gustavson, M., Roberts, D. - 1984: Berggrunnskart over
Norge - M 1:1 mill. Nor. geol. unders.

Statens Vegvesen - 1984: Vest-Agder. Diverse analyseresultater.
Distriktslaboratoriet.

Stokke, J. A. - 1986: Grus- og Pukkregisteret. Innhold og feltmetodikk.
NGU-rapport nr. 86.126.

VEST-AGDER

KARTLAGTE SAND- OG GRUSFOREKOMSTER OG REGISTRERTE PUKKVERK



TEGNFORKLARING

REGISTRERTE SAND OG GRUSFOREKOMSTER

- volumestimat mangler
- < 0.1 m³
- 0.1 – 1.0 m³
- 1.0 – 5.0 m³
- > 5.0 m³

REGISTRERTE PUKKVERK OG AKTUELLE UTTAKSOMRÅDER FOR PUKK

- ▲ uttak med kontinuerlig drift
- uttak med sporadisk drift eller nedlagte steinbrudd
- ▼ prøvetatte forekomster og/eller observasjonslokalliteter

10 km

NGU
NORGES GEOLOGISKE
UNDERSØKELSE
LØSMASSEAVDELINGEN

Referanse til kartet:
GRUSREGISTERET DES. 1986

FOREKOMSTREGISTER

vedlegg 1.1

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|---|
| Fylke- komm.nr.: <u>10.10</u> | År - måned - dato: <u>86.07.10</u> | | | | | | |
| Forekomst nr.: <u>5</u> | Inventør: <u>N.G.U K.W.</u> | | | | | | |
| Forekomst navn: <u>G.R.U.S.M.O.</u> | Kode for offentlighet: <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| KBL(DOK): <u>C.K.L.1.0.7.1.0.8</u> <u>C.K.1.1.1.-5.-1</u> <u>C.K.L.1.0.9.1.1.0</u> <u>C.K.1.1.1</u> | KBL(M711): <u>15.12.-4</u> <u>15.12.-1</u> <u>-</u> <u>-</u> | | | | | | |
| KOORD.(NGO): Y = <input type="checkbox"/> <u>482.0.0</u> X = <u>1563.00</u> | KOORD.(UTM): <u>32.V</u> <u>04273</u> <u>65295</u> | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>MATERIALTYPE (1) Sand/grus: <u>S</u> Pukk: <u>P</u> Andre matr.: <u>A</u></td> <td>FOREKOMSTTYPE (3) Breelavsetn.: <u>B</u> Elveavsetn.: <u>E</u> Bresjø/innsjø: <u></u> Strandavsetn.: <u>S</u> Morenematr.: <u>M</u> Skredmatr./ur.: <u>R</u> Forvitningsmatr.: <u>F</u> Flomskredmatr.: <u>D</u> Andre: <u>A</u></td> <td>AVSETNINGSFORM (2) Delta: <u>D</u> Isranddelta: <u>R</u> Sandur: <u>S</u> Vifte: <u>V</u> Elveslette: <u>L</u> Dalfylling: <u>T</u> Terrasse: <u></u> Esker: <u>E</u> Strandvoll: <u>N</u> Haug/rygg: <u>H</u> Randmorene: <u>M</u> Erosjonsrest: <u>O</u> Dødsterregng: <u>Ø</u> Andre: <u>X</u></td> </tr> <tr> <td>GRUNNVANNSSUTTAK (3) Gravd brønn: <u>R</u> Borebrønn: <u>B</u> Fremtidige utt.: <u>G</u> Andre: <u>A</u></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | MATERIALTYPE (1) Sand/grus: <u>S</u> Pukk: <u>P</u> Andre matr.: <u>A</u> | FOREKOMSTTYPE (3) Breelavsetn.: <u>B</u> Elveavsetn.: <u>E</u> Bresjø/innsjø: <u></u> Strandavsetn.: <u>S</u> Morenematr.: <u>M</u> Skredmatr./ur.: <u>R</u> Forvitningsmatr.: <u>F</u> Flomskredmatr.: <u>D</u> Andre: <u>A</u> | AVSETNINGSFORM (2) Delta: <u>D</u> Isranddelta: <u>R</u> Sandur: <u>S</u> Vifte: <u>V</u> Elveslette: <u>L</u> Dalfylling: <u>T</u> Terrasse: <u></u> Esker: <u>E</u> Strandvoll: <u>N</u> Haug/rygg: <u>H</u> Randmorene: <u>M</u> Erosjonsrest: <u>O</u> Dødsterregng: <u>Ø</u> Andre: <u>X</u> | GRUNNVANNSSUTTAK (3) Gravd brønn: <u>R</u> Borebrønn: <u>B</u> Fremtidige utt.: <u>G</u> Andre: <u>A</u> | | | AREAL OG VOLUM Totalt areal <u>230.200</u> m ² Gj.sn. mektigheter volum Sanns. (50%): <u>7</u> m <u>1611400</u> m ³ Min. (90%): <u>5</u> m <u>1151000</u> m ³ Maks. (10%): <u>12</u> m <u>2762400</u> m ³ NÅVÆRENDE AREALBRUK 2 922 Massetak: m ² <u>10</u> % 2 99 Bebyggelse: m ² <u>5</u> % 2 93 Kommunikasj.: m ² <u>5</u> % 3 99 Dyrka mark: m ² <u>20</u> % 4 99 Skog: m ² <u>55</u> % 6 99 Åpen fastm.: m ² <u>5</u> % 9 99 Ufordelt: m ² <u>0</u> % |
| MATERIALTYPE (1) Sand/grus: <u>S</u> Pukk: <u>P</u> Andre matr.: <u>A</u> | FOREKOMSTTYPE (3) Breelavsetn.: <u>B</u> Elveavsetn.: <u>E</u> Bresjø/innsjø: <u></u> Strandavsetn.: <u>S</u> Morenematr.: <u>M</u> Skredmatr./ur.: <u>R</u> Forvitningsmatr.: <u>F</u> Flomskredmatr.: <u>D</u> Andre: <u>A</u> | AVSETNINGSFORM (2) Delta: <u>D</u> Isranddelta: <u>R</u> Sandur: <u>S</u> Vifte: <u>V</u> Elveslette: <u>L</u> Dalfylling: <u>T</u> Terrasse: <u></u> Esker: <u>E</u> Strandvoll: <u>N</u> Haug/rygg: <u>H</u> Randmorene: <u>M</u> Erosjonsrest: <u>O</u> Dødsterregng: <u>Ø</u> Andre: <u>X</u> | | | | | |
| GRUNNVANNSSUTTAK (3) Gravd brønn: <u>R</u> Borebrønn: <u>B</u> Fremtidige utt.: <u>G</u> Andre: <u>A</u> | | | | | | | |
| REGULERINGSPLANER: | | | | | | | |

RAPPORTER/LITTERATUR SOM OMHANDLER FOREKOMSTEN

| Rapport nr. | Rapport navn | År | Unders. | Analyser |
|-------------|-------------------------------|----|---------|----------|
| 100-00A | S.T. VEGV. AUST-AGDER | 80 | SBP | KFM PH |
| NGL-85.00 | WILDESV. GRUSMØ GRUSFOREKOMST | 85 | KLUSBIP | KFMOSHR |

BESKRIVELSE: STOR BREELVTERASSE VED GRUSMO.

Foto Ja(J), Nei(N):

AVSETNINGEN ER EN AV DE FOR GRUSFORSYNINGEN I KOMMUNEN.
DET ER ET MASSETAK I DEN NORDLIGSTE DELEN HVOR MASSENE
ER GROVE OG GODT EGNET TIL VEI OG BETONGFORMÅL. DE LAVERE
ELVESLETTENE MOT SYD ER MER FINKORNIGE OG IKKE SÅ GODT
EGNET TIL TEKNISK BRUK. DENNE DELEN ER DYRKA OPP OG
RIKSVEIEN GÅR OVER FOREKOMSTEN. I NORD ER FOREKOMSTEN
FOR DET MESTE DEKKET AV SKOG. FOREKOMSTEN BØR UNDER-
SØKES MER DETALJERT.

MERKNADEB-

MASSETAKSREGISTER

Vedlegg 1.2

Forek.nr.: 5 Mt.nr.: 1 Gnr.: 100 Bnr.: 1 Flere einedommer J N N
 Kbl. (M711): 1512-4 - Koord. (UTM): 32V 04269, 65292
 Kbl. (DOK): CKL 109 110

Koord.(NGO). Y = X =

Bruker: _____

Adresse: _____

| DIRFTSFORHOLD (1) | FORDELING I MT (4) | ETTER-BEHANDLING (1) |
|-------------------|--------------------|----------------------|
| I drift: | (S) | Sliking: |
| Sporadisk drift: | S | Vasking: |
| Nedlagt: | N | Knusing: |
| | | Asfall: |
| | | Belong: |
| | | Annel: |

Anslått kornfraksjonsfordeling: Sand: 50 % Grus: 38 % Stein: 10 % Blokk: 2 %

Beskrivelse: MASSETAKET HAR EN DRIFTSHØYDE PÅ CA. 6 M. ØVERST ER ET CA. 1 M MEKTIG TOPPLAG MED GROV GRUS OG STEIN. VIDERE SKRÅSTILTE LAG MED SAND OG GRUS. MOT BUNNEN AV SNITTEI BLIR MASSENE MER SANDIGE. SØR I MASSETAKET ER DET ET GEVT LAG OGSA MOT BUNNEN (BILDE 2) MASSENE SYNES Å EGNE SEG OÅDE TIL VEI OG BETONGFORMÅL. DET ER KNUSE OG SIKTEVERK I TAK

Skisse/foto av snitt nr.: 1
0910-5.1



Fotoretnings: mot VEST

Prøve nr.: 5.1 1/2

Koord.: _____

Journal nr.: _____

Kommentarer: MASSETAKET SETT MOT VEST. TOPPLAG MED GRUS OG STEIN DEGTEER GRUS OG SAND. SAND I BUNNEN
 PROVE TIL BERGARTSSTILLING 1
 --" MINERALTELLING 2

Fotoretnings: mot

Prøve nr.: _____

Koord.: _____

Journal nr.: _____

Kommentarer: BILDET ER TATT TIL VENstre FOR BILDE 1 OG VISER ET GROV GRUSIG-STENIG LAG NÆR SÅLEN I MASSETAKET



GRUSREGISTERET - TABELL 1
FYLKESOVERSIKT

Søkekriterier
FYL 10 VEST-AGDER

Utskriftsdato : 21.11.86

| NR. | !NAVN | FOREKOMSTER | | VOLUM | AREALBRUK I % | | | | |
|------|----------------|-------------|-------------|-------|---------------|----|----|----|----|
| | | !REGI- | VOLUM- | | MILL M3 | M | B | D | S |
| | | !STRERTE | !BEREGNEDE! | | | | | | A |
| | | !Grus | Pukk! | !Grus | Pukk! | | | | |
| 1001 | KRISTIANSAND S | 5 | 3 | 5 | 4.3 | 2 | 62 | 21 | 15 |
| 1002 | MANDAL | 3 | 1 | 3 | 2.0 | 13 | 15 | 56 | 15 |
| 1003 | FARSUND | 14 | 2 | 8 | 3.2 | 8 | 7 | 65 | 10 |
| 1004 | FLEKKEFJORD | 15 | | 8 | 12.6 | 3 | 34 | 50 | 12 |
| 1014 | VENNESLA | 14 | | 11 | 9.4 | 5 | 35 | 34 | 26 |
| 1017 | SONGDALEN | 8 | 1 | 5 | 3.9 | 5 | 54 | 38 | 3 |
| 1018 | SØGNE | 5 | | 2 | .7 | 18 | 37 | 18 | 27 |
| 1021 | MARNARDAL | 10 | 1 | 7 | 5.5 | 7 | 12 | 45 | 37 |
| 1026 | ÅSERAL | 27 | | 18 | 7.4 | 2 | 15 | 50 | 33 |
| 1027 | AUDNEDAL | 11 | 1 | 7 | 5.5 | 0 | 24 | 21 | 55 |
| 1029 | LINDESNES | 7 | | 7 | 2.0 | 9 | 15 | 66 | 10 |
| 1032 | LYNGDAL | 14 | | 8 | 11.4 | 4 | 25 | 50 | 20 |
| 1034 | HÆGEBOSTAD | 9 | | 8 | 7.4 | 5 | 17 | 33 | 45 |
| 1037 | KVINESDAL | 15 | 1 | 11 | 7.0 | 4 | 18 | 66 | 12 |
| 1046 | SIRDAL | 25 | | 13 | 5.5 | 4 | 21 | 50 | 21 |
| SUM | 15 | 182 | 10 | 121 | 87.7 | 5 | 24 | 46 | 24 |
| | | | | | | | | | 1 |

TABELLFORKLARING

SUM = Antall kommuner, antall registrerte forekomster, antall
volumberegnede forekomster, volum og gjennomsnittlig arealbruk i %.

AREALBRUK I % = Anslått arealbruksfordeling i % av forekomstarealet.

M = massetak, B = bebyggelse og kommunikasjon, D = dyrka mark,
S = skog, A = annet.

GRUSREGISTERET - TABELL 2.2
 KOMMUNEOVERSIKT - FOREKOMSTER
 m/UTM-KOORDINATER

Søkekriterier
 KOM 1026 ÅSERAL

Utskriftsdato : 27. 1.87

| FOREKOMST NR. ! NAVN | ! KOORDINATER ! SONE ØST | ! MATR.! SANS. ! VOLUM! | AREAL ! AREALBRUK I % TYPE ! MEKT. ! 1000M3 ! 1000M2 ! M ! B ! D ! S ! A |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|

ÅSERAL

| | | | |
|---------------------|-------------------|----------|------------------------|
| 1 VASSBOTN | 32 404000 6487900 | S 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 2 GEITSKARET | 32 407000 6490700 | S 3 229 | 76 15 0 0 85 0 |
| 3 KYLLAND | 32 407700 6489500 | S 3 529 | 176 0 0 50 50 0 |
| 4 HÅVARSTAD | 32 408300 6486000 | S 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| 5 FISKLAND | 32 406800 6493100 | S 2 117 | 58 0 10 90 0 0 |
| 6 KVESMOEN | 32 408100 6497600 | S 2 80 | 40 0 20 80 0 0 |
| 7 ÅSLAND | 32 407600 6498300 | S 3 1328 | 442 0 15 80 5 0 |
| 8 BERG | 32 408100 6498600 | S 2 231 | 115 0 60 40 0 0 |
| 9 TODDEMONEN | 32 408800 6499300 | S 5 1283 | 256 2 13 50 35 0 |
| 10 ROMONEN | 32 409300 6500800 | S 4 186 | 46 5 0 0 95 0 |
| 11 JONESET | 32 409600 6502300 | S 3 89 | 29 0 0 0 100 0 |
| 12 TORSLAND | 32 410000 6502500 | S 2 794 | 397 0 10 50 40 0 |
| 13 SMELAND | 32 410400 6503800 | S 5 1275 | 255 5 10 55 30 0 |
| 14 EIKEMOEN | 32 410800 6504400 | S 4 120 | 30 0 0 100 0 0 |
| 15 TODDENESET | 32 410500 6504600 | S 3 234 | 78 5 20 0 75 0 |
| 16 HODNA | 32 410800 6505700 | S 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| 17 RØYDDANSMOTIPPEN | 32 411600 6509100 | A 0 0 | 47 0 0 0 0 0 0 |
| 18 RØYDDANSMOEN | 32 411700 6508800 | S 2 212 | 106 0 10 0 90 0 |
| 19 ÅKNES | 32 414200 6513400 | S 2 127 | 63 0 0 80 20 0 |
| 20 BORTELI | 32 411600 6520200 | S 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| 21 SINOREMONEN | 32 418200 6506100 | S 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| 22 HÅVESTØL | 32 418100 6507100 | S 10 391 | 39 0 80 10 10 0 |
| 23 FISKÅRDALEN | 32 417200 6508200 | S 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| 24 TJØNNÆ | 32 406400 6513000 | S 2 119 | 59 5 5 40 50 0 |
| 25 VEDHØMMEN | 32 407200 6510000 | S 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| 26 ENGSÅ | 32 415400 6494200 | S 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| 27 TROGETJØNNMONEN | 32 417100 6495100 | S 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| 28 ESKERE | 0 0 | S 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| SUM 28 | 3 | | 7350 2319 2 13 50 35 0 |

TABELLFORKLARING

KOORDINATER = Denne forekomstens UTM-koordinat, angitt ved sone, øst- og nord-verdier.

MATR.TYPE = Materialtype; S = sand og grus, P = pukk, A = andre materialer.

SANNS. MEKT. = Anslag for den mest sannsynlige mektighet i meter.

VOLUM = Anslått volum i hele 1000m3 basert på den midlere (50% sannsynlige) mektighet og ressursarealet (totalarealet evt. fratrukket massetaksarealet).

AREAL = Totalareal i hele 1000m2 (fratrukket et evt. massetaksareal).

Vedlegg 2.2

AREALBRUK I % = Anslått arealbruksfordeling i % av totalarealet;

M = Massetak, B = bebyggelse og kommunikasjon, D = dyrka mark,

S = Skog, A = annet.

SUM = Antall forekomster, antall ulike kartblad, volum, areal og
gjennomsnittsverdien for arealbruk.

GRUSREGISTERET - TABELL 5
FYLKESOVERSIKT

Søkekriterier
KOM 1026 ÅSERAL

Utskriftsdato : 23. 1.87

| Ressurstype | Avsetningstype | Ant. | Volum | % av tot |
|----------------|-----------------------|----------|------------------------|---------------|
| | | ! forek. | ! mill. m ³ | ! ant. forek. |
| Sorterte sand- | Breelvsavsetninger(B) | 19 | 4 | 68 |
| og grus- | Elveavsetninger(E) | 1 | 0 | 4 |
| avsetninger | Breelv- og Elveavs. | 6 | 2 | 21 |
| | Strandavsetninger(U) | 0 | 0 | 0 |
| Dårlig | Morenemateriale(M) | 1 | 0 | 4 |
| sorterte sand- | Morene- og breelvavs. | 0 | 0 | 0 |
| og grusavsetn. | | | | |
| Steinfyllinger | tipper | 1 | 0 | 4 |
| Pukk | fastfjelluttak | 0 | 0 | 0 |
| Sum | | 28 | | |

GRUSREGISTERET - TABELL 6
OPPLYSNINGER OM EN FOREKOMST
UTSKRIFT FRA FELTSKJEMAET

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Utskriftsdato : 26. 1.87
Ajourført dato :

| | | | |
|-------------------|--------|--------------------|---------------|
| Kommunenavn : | ÅSERAL | Forekomstnavn : | ROMONEN |
| Kommunenummer : | 1026 | Inventør : | NGU HJH |
| Forekomstnummer : | 10 | Registreringsdato: | 860816 |
| | | Kartbl.nr.(M711) : | 1412-2 |
| Antall massetak : | 2 | Koordinat(UTM) : | Sone Øst Vest |
| | | | 32 4093 65008 |

Materialtype : SAND/GRUS
Forekomsttype : BREELVAVSETNING

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------|
| Mektighet i meter | ! | Arealfordeling i % |
| | ! | Massetak : 5 |
| Midlere (50% sannsynlig) : | 4 | Bebyggelse : 0 |
| Maksimal (10% sannsynlig) : | 6 | Dyrka mark : 0 |
| Minimal (90% sannsynlig) : | 3 | Skog : 95 |
| | ! | Annet : 0 |

| | |
|---|-----|
| Forekomstareal i 1000m ² (fratrukket et evt. massetaksareal) : | 46 |
| Sannsynlig volum i 1000m ³ : | 186 |

Beskrivelse :
EN AV DE MANGE TERRASSENE I AUSTERDALEN. FINERE MATERIALE ENN I FOREKOMS
NR. 9.

GRUSREGISTERET - TABELL 7
OPPLYSNINGER OM ET MASSETAK
UTSKRIFT AV FELTSKJEMAET

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Utskriftsdato : 26. 1.87
Ajourført dato :

| | | | |
|-------------------|---------|--------------------|---------------|
| Kommunenavn : | ÅSERAL | Inventør : | NGU HJH |
| Kommunenummer : | 1026 | Dato : | 860816 |
| Forekomstnummer : | 10 | Kartbl.nr.(M711) : | 14122 |
| Forekomstnavn : | ROMONEN | Koordinat(UTM) : | Sone Øst Vest |
| Massetaksnr. : | 1 | | 32 4093 65008 |

Driftsforhold :

I DRIFT

Gårds og bruksnummer der massetaket ligger :

Gnr. : 4 Bnr. : 6

Strekker massetaket seg over flere eiendommer (J/N) ? NEI

Navn på bruker/produsent i massetaket :

Adresse :

| Anslått kornstørrelsesfordeling i % | | | |
|-------------------------------------|------------|--------------|-----------|
| (0.0063 - 2mm) | (2 - 64mm) | (64 - 256mm) | (> 256mm) |
| Sand : 90 | Grus : 10 | Stein : | Blokk : |

| Sprøhet- og flisighetstall | |
|----------------------------|---------------------|
| Prøvenummer : | Flisighet : |
| Kornfraksjon : | Sprøhet : |
| % laboratoriepukket : | Pakningsgrad : |
| | Korrigert sprøhet : |

Bergartsinnhold ! Mineralinnhold

| | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Prøvenummer : 1 | Prøvenummer : 2 | Prøvenummer : 3 |
| Kornfraksjon 8-16 mm | Kornfraksjon 0.5-1 mm | Kornfraksjon 0.125-0.25 mm |

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------|
| Bergarter i % | Mineraler i % | Mineraler i % |
| Meget sterke : | Glimmer : 0 | Glimmer/skifer : 1 |
| Sterke : 54 | Andre : 99 | Mørke : 7 |
| Svake : 45 | | Andre : 92 |
| Meget svake : 1 | | |

Beskrivelse :


SANDRIK FOREKOMST, OGSÅ EN DEL FINSAND. GRUS I TOPPLAGET.

ÅSERAL

1412-11

SAND- OG GRUSRESSURSKART 1:50000

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE



TEGNFORKLARING

LØSMASSEFOREKOMSTER

- SAND- OG GRUSFOREKOMST
- RYGSFORMET SAND- OG GRUSFOREKOMST

- S LITEN SAND- OG GRUSFOREKOMST
- M MORENE
- Z STEINTIPP

- P PRODUKSJON AV KNUSTE STEINMATERIALE FRA FAST FJELL

- ▲ UTTAK MED KONTINUERLIG DRIFT
- △ UTTAK MED SPORADISK DRIFT/NEOLAST
- P HØLG UTTRANSFERØR FOR KNUSTE STEINMATERIALE

- ANDRE OPPLYSNINGER

- / OMÅRDE MED SÅ ELLER VANSKELIG AVGRENSEBARE FOREKOMSTER

FOREKOMSTNUMMER

- HENVISNING TIL FOREKOMST
- PROVEPUNKT
- * UTTAK AV LØSMASSE

- ANALYSETYPER
- KORNSTØRELSESFORDELING
- MEKANISK STYKE (SPRØHET OG FLISIGHET)
- BERGARTS- OG MINERAL INNHOLD
- ANNET (BETONG, ABRASJON, O.L.)

ANSLÅTT VOLUM

- (OVER GRUNNANNSVIL FINNOMRÅDE MASSE ELLER FJELL)
- > 5 MILL. KUBIKKMETER

- 1 - 5 MILL. KUBIKKMETER

- 0.1 - 1 MILL. KUBIKKMETER

- < 0.1 MILL. KUBIKKMETER

VOLUMANSLAG MANGLER

ANSLÅTT KORNSTØRELSESFORDELING

- | | | | |
|----|----|--------------------|--------------------|
| SA | BL | SAND(SA) 0,063-2MM | BLOKK(BL) >25MM |
| G | ST | GRUS(G) 2-6MM | STEIN(ST) 64-256MM |

ANSLÅTT AREALBRUKSFORDeling i prosent

- NASSETAK
- BEBYGELSE OG KOMMUNIKASJONSAREAL
- DYRKET MARK
- SKOG
- ANNET (ÅPEN FASTMARK, MYR, O.L.)

BESKRIVELSE

DANNELSE AV SAND OG GRUS I NATUREN
SAND OG GRUS ER I NATUREN KONSENTRERT I FOREKOMSTER AVKA AV ENDRINGE NEDERSTØRRE, SØRLIGGIGT ER BREELV-GENSLUTNINGEN DANNER ENDRINGE NEDERSTØRRE, VESTIGEN VED SLUTTEN AV SISTE ISTID, DE KJENNETERES VID MATERIALET ER LAGDET OG SORTERT ETTER KORNSTØRELSE, ELVEAVSETNINGENE ER DANNET EFTER AT SPORADISK DRIFT ER GJØRT PÅ ENDRINGE NEDERSTØRRE MED BREELV-GENSLUTNINGEN, MEN ER OFTE NOE BEDRE SORTERT, BREELV- OG ELVEAVSETNINGENE ER PÅ KARTET SLÅTT SAMMEN TIL SAND- OG GRUSAVENTNINGER.

ANDRE AVSETNINGER PÅ KARTET SÅNG-SGRUS MØRNE KAN OSS VIST PÅ KARTET.

KARTETS INNHOLD

SAND- OG GRUSRESSURSKARTET ER ET DOKUMENTASJONSKART PÅ GRUNNLAG AV GEOPHYSIKK, PÅ VISELSLAG AV EN DRØK BEFOLKING I FELT, KARTET VISES PÅTAKKES BELIGGENHET, VOLUM, KVALITET, UTTAK AV LØSMASSE OG KNUSTE STEINMATERIALER (PLUKKVERK). ANSLÅTT VOLUM ER GJØRT PÅ ENDRINGE NEDERSTØRRE, VESTIGEN VED GJØRNINGEN TIL HØYTIDET, MÅLAGT ER DERFOR RELATIVT USIKK, VOLVANSVILESEN VISE SAND- OG GRUSVOLM OVER PÅVISTE ELLER ANTATT GRUNNANNSLAG, SITT, LEIRE ELLER MÅLAGT, VED HØYTIDEN, INNSVÆRTET TOTALT VOLUM AV FOREKOMSTENE, ANSLÅTT AREALFORDELING ER BASET PÅ EKONOMISK KARTVERK, OG FELTOBSERVASJONER, BEGYGELSE ER SKILT, SOM EGET AREALBEGREP TIL BEBYGDELIGE ALM. ALT PÅ KARTET STRØKES TIL BLOKK, STÅNSTÅDE BOLIGBLOK, KOMMUNIKASJONSAREAL OG INDUSTRI-OMRÅDE ER TATT MED UNDER BEBYGELSE.

ANSLÅTT KORNSTØRELSESFORDELING ER BEBIT.

ALVEMÅLAGT VISELSLAG, ELLER, EVENTUELTT, ANDRE ÅPNE SNITT, OPPLYSNINGENE PÅ KARTET ER KNYTET TIL ET BESTENT SNITT, FOR MER DETALJET OPPLYSNINGER OM FOREKOMSTEN HENVISER TIL GRUSAVENTNERET VED NGU OG GEOPHYSIKK, HØYTIDEN, HØYTIDEN, INNSVÆRTET OPPLYSNINGER ER REGISTRERT OG MÅLKVERT.

BRUK AV SAND- OG GRUSRESSURSKARTET

KARTET ER ET DOKUMENTSKART PÅ KARTET OG FORNUFTIG FORVALTNING OG STRØTING AV DARE SAND- OG GRUS-RESSURSER, FOR EN MER DETALJERT KARTLEGGING AV AVSETNINGENS KVALITET OG VOLUM, BØR DET FORETAS OPPFØLJENDE UNDERSØKELSER.

FYLKER OG KOMMUNER PÅ KARTET:

AUST-ÅSÅD, VEST-ÅSÅD, EVJE OG HORNNS, BYGLAND, ÅSÅDAL, AUDENÅL, HÅGEBOSTAD

1) IKKE UNDERTATT.

2) REGISTRERT, IKKE DIGITALISERT.