NORDFJORDEID

AMN 091092

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

KVARTÆRGEOLOGISK KART 1:20.000

Generell beskrivelse

Kvartærgeologien handlar om dei yngste perioden av Jorda si geologiske historie - **Kvartærtida.** Perioden er prega av store klimasvingningar med istider og varmare mellomistider. Under istidene var landet meir eller mindre dekt av innlandsbrear som grov ut og transporterte med seg store mengder lausmateriale. Mykje av dette materialet blei fraka ut i havet og avsett der. Tyngda av ismassane førde til at jordskorpa blei pressa ned. Då isen smelta vekk, heva landet seg igjen i forhold til havnivået, mest i indre strok, noko mindre ved kysten. Landhevinga har ført til at store areal med gammal hav- og fjordbotn i dag ligg over havnivået.

Lausmassane som finst på land i dag, er for det meste danna under og etter siste istid. Dei største forekomstane er knytt til heva hav- og fjordområde, dalføre og enkelte viddeområde i innlandet.

Kvartærgeologiske kart viser utbreiing og eigenskapar av lausmassane. Dei gir også opplysningar om danningsmåte, overflateformer, innlandsisen si rørsleretning og avsetningsalthevc. Kartet framstiller tilhøva nær marknivellata. Meiktighet og lagfølgje er avmerka der data føreligg. For sorterte avsetningar som f.eks. breelvavsetningar, elveavsetningar og vindavsetningar er kornstorleik viet. Lausmassane er delte inn etter danningsmåte, m.a. brotdannings er avgjerande for eigenskapane og bruksområda.

Inndeling av lausmassane

Morenemateriale er lausmassar avsette direkte av isbrear. Det ligg som eit meir eller mindre samanhengande dekke over berggrunnen. Andre lausmassetypar ligg ofte på eit underlag av morenemateriale. Morenemateriale er ofteast samansett av alle kornstorleikar frå blokk til leir, men mengda av ulike kornstorleikar kan variere. Bergartsfragment i materialet er oftast relativt skarpkanta. På og nær marknivellata er som regel blokk- og steinrikmaterialet hagane enn mot djupet. Særleg blokkrike areal er avmerka. Utrast materiale frå mektige morenesvingningar er avsett vanskeleg å avgrense frå morenemateriale ved vanleg overflatekartlegging.

Morenemateriale er delt inn på grunnlag av utbreiing og mektighet.

Morenemateriale, samanhengande dekke, stadvis med stor mektighet blir brukt for areal med få eller ingen fjellblotningar. Berggrunnen sine småformer ter ikkje tydeleg fram på grunn av morenemeiktigheten som vanlegvis er for tjuk for nokre få meter. Lokalt kan likevel meiktigheten vere langt større.

Morenemateriale, usamanhengande eller tynt dekke over berggrunnen blir brukt for areal der meiktigheten er liten. Berggrunnen sine småformer ter tydeleg fram, og som regel finst mange små fjellblotningar. I enkelte mindre berggrunnsforsenkingar kan meiktigheten vere meir enn ein halv meter.

Randmorenerygg/randmorenebelte blir brukt som nemning på ryggforma israndavsetningar (endemorenar og sidemorenar) danna ved brathamstet og konvergar stopp først og fremst under isavsmeltinga. Avsetningane er først og fremst oppbygde av morenemateriale, men stadvis kan det førekomme parti med sortert materiale. Kornfordelinga i randmorenar varierer mykje.

Breelvavsetningar (Glasifluviale avsetningar) er lausmassar avsette av strømmande smeltevatn frå isbrear. Dei er kjennetekna av at materialet er lagdelt og sortert etter kornstorleikar. Sand og grus er oftast dominerande. Stein og grus kom er som regel runda.

Hav- og fjordavsetningar (Marine avsetningar) samanhengande dekke, ofte med stor mektighet, er lausmassar botnfelte i havet. På grunn av landhevinga finst desse avsetningane ofte høgt over dagens havnivå. Silt og leir er oftast dei dominerande kornstorleikar. I mange område har det gått tørrskred. Typiske skredsonar er viste på kartet. Utrasle leirmassar kan vere vanskeleg å skilje ut frå utrosyrma hav- og fjordavsetninger ved vanleg overflatekartlegging.

Strandavsetningar (Marine strandavsetningar), samanhengande dekke, er materialet utvaska ved bølgje- og straumaktivitet i strandsona. Det ligg oftast som eit dekke over andre lausmassetypar, men førekjem også direkte på fjell. Kornstorleik og sortering kan variere mykje.

Hav- og fjordavsetninger og strandavsetningar, usamanhengande eller tynt dekke over berggrunnen, blir brukt for areal der meiktigheten gjennomgåande er liten. Som regel finst det tallrike fjellblotningar. Kornstorleiken kan veksle frå leir/ sitt til grov grus, stein.

Elve- og bekkeavsetningar (Fluviale avsetningar) er avsett etter isida ved at rennande vatn har grave, transportert og avsett materialet. Desse avsetningane har mange fellestrekk med breelvavsetningane, men dei er som regel betre sorterte, og har ofte betre runda korn. Dei kan innehalde små mengder organisk materiale.

Ur danna ved steinsprang er brukt som fellesnemning for avsetningar danna ved steinsprang.

Skredmateriale er brukt om materiale i bratte dal- eller fjellsider og er el blanding av nedrasa torvbingsmaterialle og morenemateriale med innslag av ur og organisk materiale. Meiktigheten er ofte liten, men aukar gjerne ned mot eki lausmelgande delar av skråninga. Særleg meikig er skredvifthane framfor trange gjel og sluttar i dalsida der snøskred og flaumskred gir bidrag til danninga.

Torv- og myr (Organisk materiale) er brukt som fellesnemning for førekomstar av torv, dy og gytje med meiktighet større enn ca. 0,3 m.

Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunnen omfattar område dekka av humus eller tynne torvavsetningar. Meiktigheten er til vanleg ca. 0,1 - 0,3 m, men i enkelte område kan eit råhumusdekke ha litt større meiktighet.

Tynt eller usamanhengande lausmassedekke over berggrunnen, fleire lausmassetypar i lett veisling blir brukt om område der ter eller fleire avsetningstypar veiskar så lett at dei ikkje kan skiljast ut på kartet, samtidig som ingen av dei dominerer. Meiktigheten er generelt liten, og fjellblotningar er vanlege. Denne gruppa omfattar ofteast morenemateriale, hav- og fjordavsetningar, strandavsetningar, forvitringsmateriale, or og humusdekke over fjell.

Fyllmassar er lausmassar tilførde av menneskar. Nemninga er brukt for steinlappar, seppelfyllingar og andre store fyllingar. Bakkeplanering i jordbruksområdet er ikkje inkludert.

Små eller vanskeleg avgrensbare avsetningar i område dominert av andre lausmassar/bart fjell

Slike avsetningar blir viste ved hjelp av bokstavsymbol. I område med lausmassar blir symbola brukte for avsetningar i overflata som har for liten meiktighet eller er for små til at dei kan skiljast ut med eigen farge, og for avsetningar som er innblanda i den dominerande lausmassetypen. I område med bart fjell blir symbola brukte om lausmassar i sprekker og små forsenkningar. Avsetningane har for liten meiktighet eller er for små til at dei kan skiljast ut med eigen farge.

Kornstorleik

Registrering av kornstorleik byggjer hovudsakleg på feltundersøkingar. Det er gjort ei visuell vurdering av kornstorleik ned til ca. ein meters djup. I tillegg kan eventuelle variasjonar mot djupet bli gitt som lagfølgje. Ved omtalen av sorterte avsetningar blir hovudfraksjon gitt i substantivform. Dersom andre fraksjonar inngår med meir enn 10%, er desse omtala i adjektivform slik eksempla i tekstforklaringa viser.

Supplerande granskingar av lausmassane

Prøvetaking er gjort for nærare å kunne avgjere samansetning og eigenskapar til lausmassane. Prøvelokalitetane er avmerka på kartet og viser kva laboratorieanalysar som er gjort, f.eks. kornfordeling, sprøhet og flisighet, betongprøvestyrking.

Boringar, seismiske undersøkingar og elektriske motstandsmålingar blir gjort for å vurdere lausavsetningane si meiktighet og utbreiing. Samtidig gir desse metodane informasjonar om tjukna og samansetninga av dei enkelte lag.

Bruk av kartet i arealplanlegging og ressursforvalting

Lausmassane er ein fundamental naturressurs på linje med vatn og luft. Dei er sjølve grunnlaget for plante- og dyreliv, og dermed for landbruk og busetnad. Prosest på lausavsetningane våre har auka sterkt i dei seinaste åra, særleg i og omkring tettstadane. Disponering av areal til byggegrunn, kommunikasjonsnett, uttak av grunnvatn, soppelplassar, resipient og massetak for bygge- og anleggsverksemd er eksempel på ulik bruk av lausmassane. Dei fleste av desse bruksmåtane fører til at areal og massar blir handlagt for alltid eller for lang tid. Ofte vil ein bruksmåte utelukke dei andre, og dette kan gi grunnlag for konfliktar. Kvartærgeologiske kart (og andre temakart) er eit hjelpemiddel til å oppnå fornuftig forvalting og utnytting av naturressursane våre. I planleggings vil kartet vere til stor hjelp i vurderinga av alternative bruksformer for ulike avsetningstypar. Dette vil m.a. kunne hindre nedbygging av sand- og grusførekomstar og verdifull dyrkingsjord.

Byggeråstoff. Kvartærgeologiske kart viser areal med lausmassar eigna til forskjellige formål. Grus- og sandførekomstar til betong- og vegformål er helst knytte til breelv- og elveavsetningar. Sandige og grusige morenetypar kan også eigne seg til vegformål. Leir- og siltavsetningar (havavsetningar) kan brukast til teglstein og som tilslag i tettbetong. For å klarlegge kvalitet og mengde av avsetningane, bør det gjerast oppfølgjande granskingar.

Byggegrunn. Korleis lausmassane eignar seg som byggegrunn avheng særleg av deira tjukn, fasleigenskapar, bereevne, stabilitet og dreneringstilhøve. Ved konkrete utbyggingsprosjekt vil kvartærgeologiske kart ikkje erstatte detaljerte grunnundersøkingar. Det kan likevel brukast på planstadiet til å avgrense mulege område med dårleg byggjegrunn der detaljundersøkingar er naudsynte, f.eks. på forkomoje avsetningar og myr.

Dyrkingsjord finst særleg innan område med finkornige hav- og fjordavsetningar, samanhengande dekke av morenemateriale, elvesletter og myrområde. Innan desse områda viser kartet også areal som er lite egna til dyrkingsjord på grunn av blokkrik overflate, haugar og ryggar, ravinar o.l.

Grunnvatn. Dei fleste store nyttbare grunnvassforekomstane finst i tilknyting til breelv- og elvlavsetningane. Oppfølgjane undersøkingar er naudsynte for å klarejere vatnet sin kvalitet og uttakbar mengde, og for lokalisering av brønnar.

Verning - fredning. På grunnlag av kvartærgeologiske kart kan disponering av lausmassar til ulike praktiske føremål samordnast med planar for bevaring av verneverdig natur.

Malmleiting. Blokkleiting, tungmineralanalysar og geokjemiske analysar er vanleg nytta metodar for malmleiting i område dekka av lausavsetningar. Tolking av resultata for å kunne spore tilbake til malmførekomstane i fast fjell krev god kjennskap til m.a. lausmassane si lagfølgje, transportretning og - lengde.

Annan bruk. Karta kan brukast i forskning og undervising. Vidare er det eit veleigna utgangspunkt for spesialundersøkingar, m.a. i ingeniørgeologi og geoteknikk.

Spesiell beskrivelse

Topografi

Dominerande i landskapet er den vel 200 m djupe Eidsfjorden og den tørrlagte forlengjinga austover, Eidsdalen. Den flata dalbotnen ligg vel 60 m o.h. ved vestenden av Homindalsvatnet like sør for kartkanten (sjå nokkekart).

Frå Naustdal (UTM 348692) strekkjer Hjelmelandsdalen seg nordaustover. Ved vaskiljet mot Sunnmøre i nordaustre hjørnet av kartet ligg dalbotnen vel 400 m o.h.

Dei høgste fjelltoppane i området ligg vel 900 m o.h.

Berggrunn

Bergartane er av prekambrisk alder. Dei blei meir eller mindre deformerte under den kaledonske fjellkjedefoldinga. Hovudbergartane er ulike gneisslyper. Nord for Eidsfjorden skjer smale, aust-vestgående soner med kvartsskifer, kvartsitt eller amfibolitt og metasandstein seg gjennom området. I dei same området førekjem også spreidde førekomstar av eklogitt.

Isrørsler

Måling av isskuringsretningar viser ei eldste isrørsle mot nord og nordvest. Denne rørsla stammar frå ein periode då innlandsisen var så mektig at han var lite påverka av den underliggande topografien. Morenedekket som ligg langt oppover nordsida av Hjelmelandsdalen er truleg ei sluttavsetning frå denne perioden. Yngre brerørsler som representerer nedsmeltingsfasen, følgde hovuddalføra.

Isavsmeltingstida - dominerande avsetningar

For 11-12000 år sidan smelta isen bort frå Eidsfjorden-Eidsdalen. Havet trengte inn over Eidsdalen som dermed blei fjordbotn. Isen i Hjelmelandsdalen forsvann også på denne tida og dalen har vore isfri sidan. Under isavsmeltinga i Hjelmelansdalen og fjella omkring blei store breelvavsetningar bygde opp i området Naustdal-Haugen (UTM 3647?9 - 3707?5). Nedst i Naustdal og i Eidsdalen/Eidsfjorden blei det avsett leire og silt (havavsetningar).

For nesten 11 000 år sidan gjorden breen eit nytt framstøt vestover Eidsdalen/Eidsfjorden. Havavsetningane blei omsette, tilførte stein og blokk og pressa saman (konsoliderte). Desse massane stikk fram i dagen som mektige morenevavsetninger nord og sør for Nordfjordeid sentrum. (Sjå også profil A-A1)

Nokre hundre år seinare smelta isen på nytt bort frå Eidsdalen. Havet trengte nok ein gong inn over dalen og havavsetninger blei avsleia i fjordbotnen. Desse avsetningane ser vi i dagen opp mot begge dalsiden. Dei fleste stader ligg desse avsetningane også under dei yngre elve- og strandavsetningane. (Sjå profil A-A1 og B-B1.) Der gneisen pressa seg inn blei avsette ikke ikamtor bretbnnten som blei liggande et tid i området vest for Hominddalsvatnet (ved den austre kartkanten). Breskiverassane som strekkjer seg frå Hominddalsvatnet og vestover til Rottlofonn (UTM 4406?2), ligg dei fleste stader oppå havavsetninger. (Sjå profil B-B1)

Postglasial tid - erosjon

Under landhevinga etter at isen smelta bort, har elvar og bekkar eroderi i avsetningane. Elvetarrasane i Eidsdalen og ved Naustdal er vanlegvis samansette av ein nokre få meter meldig sand- og grupsskike over havavsetningar. Lokalt kan elveavsetningane vere langt mektigare. (F.eks. Lunden masseuttak; UTM 422680, Profil A-A1)

Denne perioden er også prega av ein del skredaktivitet i dalsidene. Una nedatnor Storhaugmikken (UTM 402?10) er resultat av sterk skrasprengsaktivitet.

Gamle havnivå

Då isen forsvann frå Eidsdalen fylgde havet etter bretronten inn dalen. Mast markerte er terrasser og strandlinjer som blei danna midt i yngre dryas for ca. 10500 år sidan. Del ligg ca. 50 m.o.h. og er lette å få auga på på begge sider av Eidsdalen. Lågareliggande elvatterrasser og strandvollar representerer yngre havnivå frå etter siste istid.

Litteratur:

Bryhni, I. 1974: Preliminært berggrunnskart Nordfjordeid 1218! - M 1:50 000. Nor. geol. unders.

Fareth, O. W. 1970: Brerandstudier i midtre og indre Nordfjord. Upubl. hovudoppg. Univ. i Bergen.

Mangerud et al. 1979: Glacial history of western Norway 15000–10000 B.P. Boreas 8, 179-187.

Stokke, J. A. 1981: Lesmassekartlegging i Eidsdalen og Naustdalen, Eid kommune, Sogn og Fjordane. NGU-rapport 1560/22.

Teiknforklaring

Lausmassar

- Morenemateriale, samanhengande dekke, stadvis med stor mektighet
- Morenemateriale, usamanhengande eller tynt dekke over berggrunnen
- Randmorenerygg/randmorenebelte
- Breelvavsetninger (Glasifluviale avsetninger)
- Hav- og fjordavsetninger (Marine avsetninger), samanhengande dekke, ofte med stor mektighet
- Marin strandavsetning, samanhengande dekke
- Hav- og fjordavsetninger og strandavsetninger, usamanhengande eller tynt dekke over berggrunnen
- Elve- og bekkeavsetninger (Fluviale avsetninger)
- Ur danna ved steinsprang
- Skredmaterialе
- Torv- og myr (Organisk materiale)
- Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunnen
- Fyllmassar (Lausmassar tilført eller sterkt påverka av mennеske)

Bart fjell

- Bart fjell
- Liten fjellblotning

Små eller vanskeleg avgrensbare avsetningar i område dominert av andre lausmassar/bart fjell

- M Morenemateriale
- B Breelvavsetninger
- H Hav- og fjordavsetninger
- M Marine strandavsetninger
- E Elve- og bekkeavsetninger
- F Forvitringsmateriale
- R Ur
- Sk Skredmateriale (Rasmateriale)
- T Torv og myr
- Z Fyllmassar

Kornstorleik

Fraksjonar

- Blokk (B) Større enn 256 mm
- Stein (St) 256 mm- 64 mm
- Grus (G) 64 mm–2 mm
- Sand (S) 2 mm–0,063 mm
- Silt (Si) 0,063 mm–0,002 mm
- Leir (L) Mindre enn 0,002 mm

Mektighet og lagfølgje

(Bokstavsymbols for avsetningstypar og kornstorleikar er vist ovantor)

Eksempel

- >3 Den kartlagte avsetninga er 3 m mektig
- >>2 Den kartlagte avsetninga er mektigare enn 2 m
- >5 Mektigheten er bedemt til meir enn 5 m
- <15/130/?/ Den kartlagte avsetninga inneheld 1 m sand, under er det 3 m grus over fjell
- <2/16/?B?/1 Den kartlagte avsetninga er 2 m mektig, under er det en 5 m hav- og fjordavsetninger over morenemateriale som er meir enn 1 m mektig

Isrørsleretning

- Isskuringsstripe, rørsle mot observasjonspunktet
- Kryssande isskuringsstriper, zntlat hakar aukar med aukande relativ alder
- ⟵ubestemt relativ alder)
- Isskuringsstripe, to mulige isrørsleretninger
- Isskuringsstriper innanfor en sektor
- Parallelle furer i overflata (Fluted surface)

Overflateformer

- Breelvetilsnjoring
- Smeltevasslap
- Elve- eller bekkenedskjering
- Tidligare elve- eller bekkelap
- Stor elvenedskjering og eller breelvmedskjering i fjell (stort gjel)
- Elvenedskjering og eller breelvnedskjering i fjell (gjel)
- Terrassekant
- Viftetorm
- Strandvoll
- Strandline i lausmassar
- Ravine
- Skredkant
- Aktiv elve- bekkeerosjon eller grunnvasserosjon i eit lite område
- Ryggform
- Haug- og ryggforma overflate

Andre symboler

- Høgt blokkinnhald i overflata
- Stor enkeltblokk
- Skjelleskonut
- Masselak i drift
- Masselak, nedlagt eller i sporadisk drift
- 102 Marin grense (m.o.h.)
- Bakkeplanering

Supplerande undersøkingar av lausmassane

- Boring
- **Prøvelokalitetar og analysetype:**
- Kornfordeling
- ⊕ T-1-5201 Radiocarbon-datering, med lab.referanse NTH

Kartlagt av Norges geologiske undersøkelse i 1982.
Feltarbeidet er utført av O. Klakegg, K. Robertsen og T. Nordahl-Olsen.

Referanse til dette kartet: KLAKEGG, O. og NORDAHL-OLSEN, T. – 1987
NORDFJORDEID, AMN 091092-20, kvartærgeologisk kart
Norges geologiske undersøkelse

KARTBLADINNDELING



Kvartærgeologisk kart utgitt i M. 1:20.000 i tilknytning til NGU's kvartærgeologiske kartlegging i M. 1:50.000

Kvartærgeologisk kart utgitt i M. 1:50.000

Kartbladinndeling i NGO's serie M.711

Kartgrunnlag: Økonomisk kartverk. Høgdeekvistvåa etter NGO's kart i serie M711, ekv. 20 m
Reprografi Norges geologiske undersøkelse
Trykk A/S Aktietrykkeriet – 1987



Profil A – A¹: Tverrprofil av Eidsdalen med prinsippskisse av den vertikale lagdelinga i sedimenta.



Profil B – B¹: Lengdeprofil av Eidsdalen med prinsippskisse av den vertikale lagdelinga i sedimenta.



Målestokk: 1:20 000

0,5 0 1 2 km

Ekvidistanse: 5 m